အစာပထမ ဦး ဆုံးဝင်လာတဲ့အခါ taneously
အူသိမ်။ duodenum
re- တွင်အဓိကအားဖြင့်အပိုင်းခွဲရန်စတင်သည်။
ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒေသခံတင်းကျပ်မှုမှတုံ့ပြန်မှု
chyme ရှိနေခြင်း အပိုင်း-
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊
လျှို့ဝှက်ထားသော gastrin မှဖြစ်ပေါ်လာသည်
chyme ရှိနေခြင်းကိုတုံ့ပြန်ရန်
အစာအိမ်၌သံသောယန္တရားတစ်ခု
အစာအိမ် နှင့် **ဆိုင်သောတုံ့ပြန်မှု** အဖြစ် Extrinsic ဖြစ်သည့်အကြွင်း
အာရုံကြောများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
ဤကဲ့သို့ခြင်းParasympathetic ဖြစ်တယ်
လှုံ့ဆော်မှုသည် segmentation ကိုတိုးတက်စေသည်
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးသူမှာ
segmental activity ကိုကျဆင်းစေသည်။



သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ

seg- အားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောစပ်မှု
mentation သည်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်သည်
chyme ကိုမြေကြီးနှင့်ရော။
သေးငယ်တဲ့အရည်လေးတွေ
အူလမ်းကြောင်း lumen နှင့်အရာအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
chyme ၏စုပ်ယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်များသို့
အူသိမ် mucosa ။
အပိုင်းခွဲခြင်းသာမက၊
plishes ရောစပ်ဒါပေမယ့်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်း
chyme ကိုသေးငယ်တဲ့အရာကတဆင့်
ဝေးစေ့။ ဒါကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ
segmental contraction သည် chyme ကိုရှေ့နောက်နောက်သို့တွန်းပို့သည်။
ရပ်ကွက်? chyme သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့သို့တိုးလာသည်။
သေးငယ်မှု၏အရည်တစ်လျှောက်တွင်အပိုင်းခွဲမှုကျဆင်းသည်
အူ။ duodenum ရှိ pacemaker ဆဲလ်များသည်အလို့အလျောက်ဖြစ်ပေါ်သည်
ဝေစာနှင့်ဝေးကွာသောနေရာများထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်ပါ၊
duodenum တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကျုံ့ခြင်းကိုဖော်ပြသည်
တစ်မိနစ်လျှင် ၁၂ နှုန်း၊ terminal တွင်တစ်မိနစ်လျှင် ၉ ခုသာရှိသည်
ileum ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကြမ်းနှုန်းပိုများလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
အူသိမ်၏အထက်ပိုင်းသည်အောက်ပိုင်းထက်၊
chyme ကိုပျမ်းမျအားဖြင့်တွန်းသည်ထက်တွန်းသည်
နောက်ပြန်။ ထို့ကြောင့် chyme သည်အလွန်နေးကွေးစွာရွေ့လျားလာသည်
အူသိမ်၏အောက်ပိုင်းမှအထက်ပိုင်းသို့ရှုပ်ထွေးခြင်း
နှံစပ်စပ်ရောစပ်ပြီးစုပ်ယူမှုကိုပြီးမြောက်စေရန်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်
ဖြစ်စဉ်၌ ဤနေးကွေးသောတွန်းကန်မှုယန္တရားသည်အားသာချက်ရှိသည်
အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အစာခြေဖျက်ရန်နှင့်စုပ်ယူရန်လုံလောက်သောအချိန်ကိုခွင့်ပြုသည်
ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်းအရာများသည် ၃ နာရီမှ ၅ နာရီကြာသည်
အူသိမ်မှတဆင့်ရွှေ့လျားရန်

ရွှေ့လျားနိုင်သောရွှေ့လျားမှုရပ်ထွေးသည့် အစားအစာများအကြားအူလမ်းကြောင်းကိုသန့်ရှင်းစေသည်။

အစားအစာအများစုကိုစုပ်ယူလိုက်သောအခါခွဲခြမ်းခြင်း
သွားလာမှု များရပ်တန့်သွားပြီး **ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ** ကအစားအစာများအကြားသေးငယ်ထိုးကြေဆည်းပါ။
motility complex (သို့) **“ အူအိမ်စောင့်”** ဒီ
-အစာစားခြင်းလှုပ်ရှားမှုသည်အားနည်းခြင်း၊ ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သော peristaltic ရွေ့လျားမှု
မသေဆုံးမီအူလမ်းကြောင်းမှအကွာအဝေးသို့ရွှေ့လျားသောလှိုင်းများ
ထွက်နေသည်။ လှိုင်းများသည်အစာအိမ်မစတင်ပြီးအောက်သို့ရွှေ့လျားသွားသည်
အူ; ဆိုလိုသည်မှာ peristaltic လှိုင်းအသစ်တစ်ခုစီကို site a တွင်စတင်ခဲ့သည်
အူသိမ်အောက်ဘက်နည်းနည်းဝေးတယ်။ ဤရွှေ့ကား peristaltic တိုတောင်းသည်
လှိုင်းများသည်မိနစ် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ ခန့်ကြာသည်

ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုစီနှင့်အစာအိမ်သည်အူသိမ်၏အဆုံးသို့
ရှေ့ကအစာအကြွင်းအကျန်နဲ့ mucosal တွေကိုရှင်းပစ်ပါ
အပျက်အစီးများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများသည်အူမကြီးဆီသို့ ဦး တည်နေသည်
"အူလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းသူ" ပြီးရင်အူသိမ်ကိုကုတယ်
ရောက်သည်နှင့်သံသရာသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ပြီးသူ့အလိုလိုဆက်သွားသည်
နောက်ထမင်းစားချိန်အထိ ရွှေ့လျားသွားလာနိုင်သောရွှေ့လျားမှုရှုပ်ထွေးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်
ဟော်မုန်းများကအစားအစာများအကြား **motilin,** dur- လှို့လှို့ဝှက်ဝှက်သော
အူသိမ်၏အဆုံးသို့ endocrine ဆဲလ်များဖြင့် unfed state ကိုရောက်သည်
mucosa ။ နောက်တစ်နေ့ရောက်သောအခါ segmental လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တစ်ဖန်ပြန်လည်ရွှေ့လျားသွားပြီးရွှေ့လျားရွှေ့လျားနိုင်သောရွှေ့လျားမှုရှုပ်ထွေးမှုရပ်သွားသည်။ Motilin
အစာကျွေးခြင်းဖြင့်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတားမြစ်သည်။

ileocecal ဆုံမှတ်သည်လှုပ်ရှားမှုကိုကာကွယ်ပေးသည် အူသိမ်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ sphincter ကိုဖွဲ့စည်းသည်။

အူသိမ်နှင့်အူမကြီးကြားတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်
အဆိုပါ cecum သို့ ileum ဗလာ (၏အစိတ်အပိုင်း • ပုံ 16-20) ။ နှစ်ယောက်
အချက်များသည်ဤဒေသ၏အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
သေးငယ်ပြီးကြီးမားသောအူများကိုဆွဲထုတ်သည်။ ပထမ ဦး စွာခန္ဓာဗေဒ
rangement သည် valvelike ကဲ့သို့တစ်သျှူးများထွက်လာသောခေါက်ရိုးများဖြစ်သည်
ileum သည် cecum ၏ lumen ထဲသို့ ileal မှာပါဝင်သောအရာများ
ရှေ့သို့တွန်းပို့နေသည်၊ ဤ **ileocecal valve** ကိုအလွယ်တကူတွန်းဖွင့်သည်၊
ileal ၏နောက်ဆုံးစင်တိမ်တာများစွာအတွင်းထူထပ်လာသည်။
အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ sphincter ကိုဖွဲ့စည်းသည်။
ဤ **ileocecal sphincter** အများစုသည် အနည်းဆုံးအနည်းငယ်သာကျန်သေးသည်
ချုပ်ထားသည်။ sphincter ၏ cecal ဘက်မှဖိအားသည်၎င်းကိုဖြစ်စေသည်
အတင်းအကြပ်စာချုပ်ချုပ်ရန်၊ ileal ဘက်ခြမ်း၏တင်းအားသည်ဖြစ်စေသည်
အပန်းဖြေရန် sphincteri ပင်ကိုယ် plexuses များမှကြားဝင်တုံ့ပြန်သောတုံ့ပြန်မှု

ဧရိယာ၌ ဤနည်းအားဖြင့် ileocecal ဆုံမှတ်သည်၎င်းကိုကာကွယ်ပေးသည်
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများပါဝင်သောအရာ ၀ တ္ထုများ၊
အူသိမ်အတွင်းသို့တစ်ချိန်တည်းတွင် ileal ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။
တိမ်များသည်အူမကြီးထဲသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။ အူမကြီးဘက်တီးရီးယားများဝင်ရောက်ခြင်း
အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝသောအူသိမ်သည်၎င်းတို့လျင်မြန်စွာပွားများလိမ့်မည်။
Gastrin ကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် sphincter ကိုအပန်းဖြေစေသည်
အစာစတင်ချိန်တွင်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုပြင့်တက်နေစဉ်
နေရာ။ ဤအပန်းဖြေမှုသည်အစာမကြေသောအမျှင်များနှင့် unab-

ထို့ကြောင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတင်းဓာတ်ကိုအစာချေဖျက်မှုအတွင်းပြီးစီးသည်
brush border ၏ကန့်သတ်ချက်များ (▲ ဧယား ၁၆-၆ သည်ပေါင်းလဒ်ကိုပေးသည်။
mary သည်အစာချေဖျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြစ်သည်
ဆောင်ရွက်ချက်များ။)
မျှတသောအဖြစ်များသောရောဂါတစ်ခု၊ **lactose သည်းမခံခြင်းတွင်** ပါဝင်သည်
Lactase ချို့တွဲခြင်း၊ disaccharidase အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်
lactose (သို့) ဓို့သကြားကိုအစာချေဖျက်ခြင်း ကလေးအများစု
အသက် ၄ နှစ်အောက်၌လုံလောက်သော lactase ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်

ခရုကောင်အနှံသည်ရောဂါဖြစ်ပွားစေသည်။

အူသိမ်မှထွက်သောအရည်များမပါ ဝ င်ပါ မည်သည့်အစာခြေအင်ဇိုင်းများ

နေ့စဉ်အူသိမ် mucosa ရှိ exocrine ဂလင်းဆဲလ်များ
lumen ထဲသို့ aqueous ဆား ၁.၅ လီတာခန့်နှင့်
succus entericus (“ အူဖျော်ရည်”) ဟုခေါ်သောခွဲ ရည်။
ဒေသခံများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်သောအားဖြင့်အစာစားပြီးနောက်အထွက်သည်တိုးလာသည်
chyme ရှိနေခြင်းကြောင့်အူသိမ် mucosa
အရွဲတွင်အခွဲသည်အကာအကွယ်နှင့်ချောဆီပေးသည်။
သတ်မှတ်ချက် ထိုပြင်ဤအရည်ဓာတ်သည်များစွာထောက်ပံ့ပေးသည်
H_2O သည်အစာချေဖျက်မှုတွင်ပါ ဝ ငသည်။ သတိရမိသည်
ငင်းတွင်အစာချေဖျက်ခြင်းသည်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အနောင်အဖွဲ့ပြိုကွဲခြင်းခံပါ ဝ ငသည်
H ကိုနှင့်အတူ $_2$ O-ပေးသောအခါ, အပေါ်ပျားတို့သ reac- အများဆုံးထိထိရောက်ရောက်ဆက်ဇောက်
ဘောင်းဘီများသည်အဖြေရှာနေသည်။
ဤအစာရည်ထဲသို့အစာခြေအင်ဇိုင်းများမရှိပါ။
အူသိမ်သည်အစာခြေအင်ဇိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်
epithelial ဆဲလ်များ၏ brush-border membrane ၌လုပ်ဆောင်သည်
ငင်းအား lumen ထဲသို့တိုက်ရိုက်လျှို့ဝှက်ခြင်းအစား lumen ကိုတန်းစီစေသည်
lumen ။

အူသိမ်အင်ဇိုင်းများသည်အစာချေဖျက်မှုကိုပြီးမြောက်စေသည် brush-border membrane အတွင်း။။

အူသိမ် lumen အတွင်းအစာချေဖျက်ခြင်းကိုပြီးမြောက်စေသည်
ပန်ကရိယအင်ဇိုင်းများနှင့်အဆီချေဖျက်မှုကိုဖြင့်တင်ပေးသည်
သည်းခြေရည်ထွက်ခြင်း။ ပန်ကရိယ enzymatic လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အဆီ
ငင်းတို့စုပ်ယူနိုင်သော monoglyc ယူနှစ်များကိုလုံးဝလျှော့ချလိုက်သည်။
erides နှင့် free fatty acids များ၊ ပရိတိန်းများကိုသေးငယ်သောအရာများအဖြစ်ခွဲသည်
peptide အပိုင်းအစများနှင့်အချို့သောအဓိဇိန်အက်ဆစ်များနှင့်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ
disaccharides နှင့်အချို့ monosaccharides သို့လျော့ချသည်။ ထို့ကြောင့်,
အဆီချေဖျက်မှုသည်အူသိမ် lumen အတွင်း၌ပြီးမြောက်သည်
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အသားဓာတ်ကိုအစာချေဖျက်ခြင်းသို့မရောက်ခဲ့ပေ
ပြီးစီး

luminal မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အထူးဆံပင်ပုံစံခန့်မှန်းချက်များ
အူသိမ် epithelial ဆဲလ်များဖြစ်သော **microvilli** သည် **ဖြီးသည်**
နယ်စပ် (စာမျက်နှာ ၄၈ ကိုကြည့်ပါ) ။ brush-border plasma membrane သည်၊
ငင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောပေါင်းစည်းထားသောပရိတိန်းအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်
အင်ဇိုင်းများ

၁။ ပန်ကရိယ proteolytic ကိုတက်ကြွစေသော **Enterokinase**
trypsinogen အင်ဇိုင်း

2. အဆိုပါ **disaccharidases (maltase, sucrase,** နှင့် **lactase),** အရာ
ကြွင်းသောအရာကို hydrolyzing ခြင်းဖြင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အစာကိုဖြည့်သည်
disaccharides (maltose, sucrose နှင့် lactose အသီးသီး) သို့
သူတို့၏ပါဝင်သော monosaccharides

3. အဆိုပါ **aminopeptidases,** ငယ်အများစု hydrolyze ရာ
peptide အပိုင်းအစများသည်ငင်းတို့၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်တိအပိုင်းများသို့ရောက်
ပရိတင်းအစာချေဖျက်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်

အရွဲ၊ခြေရောခြင်းသို့မများစုတက်ရောက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချိန်နှုန်းအဖြည့်ကြွယ်ဝစေရန်နှုန်းထားနှိုင်းတွေထွက်တတ်လဲ
Lactase ချို့တဲ့သောသူတစ် ဦး အားအစာအိမ်မအဓိသာဖြစ်စေသည်
lactose သည် lumen တွင်ရှိနေပြီးဆက်စပ်မှုများစွာရှိသည်။
quences များ ပထမ ဦး စွာအစာမကြေ lactose များစုဆောင်းခြင်းသည်ဖန်တီးပေးသည်
H_2O ကိုအူလမ်းကြောင်း lumen ထဲသို့ ဆွဲသွင်းသော osmotic gradient
ဒုတိယအချက်မှာအူမကြီးတွင်နေထိုင်သောဘက်တီးရီးယားများသည် lactose ဖြစ်သည်။
ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်သူတို့သည် lactose ကိုစွမ်းအင်တစ်ခုအဖြစ်စိတ်ထက်သန်စွာတိုက်ခိုက်ကြသည်
အရင်းအမြစ်, ကြီးမားတဲ့ CO ၏ပမာဏထုတ်လုပ် $_2$ နှင့်မီသိန်းဓာတ်ငွေ့
လုပ်ငန်းစဉ် အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့နစ်ခုလုံးဖြင့်အူကိုကျုံးစေသည်
နာကျင်ခြင်း (ကြွက်တက်ခြင်း) နှင့်ဝမ်းလျော့ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ Lactose ပါသောကလေးငယ်များ
သည်မခံနိုင်ခြင်းသည်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကိုလည်းခံစားရနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူဖို့ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
ဤအချိန်ထိအစားအစာ၊ ရေ (သို့) လျှပ်စစ်ဓာတ်များမရရှိသေးပါ
ပမ်းယူသည်။

အူသိမ်သည်သိသိသာသာကောင်းမွန်စွာအဆင်ပြေသွားသည့် စုပ်ယူမှုဒဋ္ဌဝင်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍ

ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိတင်းနှင့်အဆီချေဖျက်မှုထုတ်ကုန်များအားလုံးသည်
မျိုချမိသော electrolytes များ၊ ဗီတာမင်များနှင့်ရေအများစုကဲ့သို့ဖြစ်သည်
ပုံမှန်အားဖြင့်အူသိမ်သည်အများအားဖြင့်ခွဲခြားသည်။ Usu-
မဟာမိတ်သည်ကယ်လ်စီယမ်နှင့်သံကိုစုပ်ယူမှုကိုသာညှိပေးသည်
ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်။ ထို့ကြောင့်အစာများများစားလေ၊ ပိုစားလေဖြစ်သည်
ထိန်ချုပ်ရန်ကြိုးစားနေသူများကဲ့သို့ကြေညက်ပြီးစုပ်ယူပါ
သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်များသည်နာကျင်စွာသိသည်။

စုပ်ယူမှုအများစုသည် duodenum နှင့် jejunum တို့တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ileum တွင်မရှိသောကြောင့် ileum တွင်အလွန်ဖြစ်ပေါ်သည်
စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်၊ သို့သော်စုပ်ယူမှုအများစုသည်
အလယ်အလတ်ကြေးစားမရောက်မီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ
ileum ။ အူသိမ်တွင်အရံစုပ်ယူနိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။
tive စွမ်းရည် အူသိမ်၏ ၅၀% ခန့်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်
ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနှင့်စုပ်ယူမှုကိုအနည်းငယ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍
terminal ileum ကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ဗီတာမင် B_{12} နှင့်သည်းခြေရည်ဆားများမပါပါ
စနစ်တကျစုပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပိုဆောင်ရေးစနစ်
ဤဝတ္ထုနှစ်ခုအတွက် nism များသည်ဤဒေသတွင်သာတည်ရှိသည်။
သေးငယ်တဲ့အရာတစ်လျှောက်လုံးမှာအခြားအရာတွေကိုစုပ်ယူနိုင်တယ်။
ဝေ့စေ့ရဲ့အရှည်။

အူသိမ်၏အကျိုးခံသည်သိသိသာသာကောင်းမွန်သည်
အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအတွက်ငင်း၏အထူးစုပ်ယူနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည်။
(၁) ငင်းတွင်အလွန်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းရှိပြီး (၂) epithelial ဆဲလ်များပါ ဝ ငသည်
ဤအဖုံး၌အထူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားအမျိုးမျိုးရှိသည်။

အသေးစား INTESTINE ၏ SURFACE ကိုတိုးပွားစေသောပြဖြင်မြောင်းလဲမှုများ

AREA အူသိမ်၏အောက်ပါအထူးပြုပြင်မှုမ်းမံမှုများ
mucosa သည်စုပ်ယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုအလွန်တိုးစေသည်။
ပုံ (• ပုံ ၁၆-၂၁)

- အူသိမ်၏အတွင်းမျက်နှာပြင်ကိုအ ဝ တ်များအတွင်းသို့ပစ်ချသည်။
  မျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုသုံးဆခေါက်ပါ။

စာမျက်နှာ ၃

▲ TABLE 16-6 **အာဟာရအမျိုးအစားသုံးမျိုးအတွက်အစာခြေဖြစ်စဉ်များ**

	အင်ဇိုင်းတွေအတွက်ပါအစာခြေဖျက်ခြင်း အာဟာရဓာတ်	အရင်းအမြစ် အင်ဇိုင်းများ	လျှပ်ရှားမှုဆိုက် အင်ဇိုင်းများ	Enzymes ၏လုပ်ဆောင်ချက်	စုပ်ယူနိုင်သည့် ယူနစ်များ အာဟာရဓာတ်
ကစီဓာတ်	Amylase	တံထွေးဂလင်းများ	ပါးစပ်နှင့် (အများအားဖြင့်) ခန္ဓာကိုယ်အစာအိမ်	Hydrolyzes polysac- ဆေး၊ disaccha အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ် စီးနင်းမှု	
		Exocrine ပန်ကရိယ	အူသိမ် lumen		
	Disaccharidases (maltase၊ sucrase၊ လက်စတာ)	အူသိမ် epithelial ဆဲလ်များ	အူသိမ် brush နယ်စပ်	Hydrolyze disaccha- monosac သို့စီးခြင်း charides	Monoaccha- စီးနင်းမှုများ၊ အထူးသဖြင့် ဂလူးကို့စ်
အသားဓာတ်	Pepsin	အစာအိမ်ဆဲလ်များကိုချုပ်ပေးသည်အစာအိမ်- ခုံရင်း		Hydrolyzes ပရိတိန်း peptide အပိုင်းအစများသို့	
	Trypsin၊ chymotrypsin carboxypeptidase	Exocrine ပန်ကရိယ	အူသိမ် lumen	ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ခိုက်မှုများ ဒီရေအပိုင်းအစများ	
	Aminopeptidases	အူသိမ် epithelial ဆဲလ်များ	အူသိမ် brush နယ်စပ်	Hydrolyze peptide အပိုင်းအစများသည်အမိုင်နို အက်ဆစ်	အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့် သေးငယ်တဲ့အနည်းငယ် ဒီရေ
အဆီ	Lipase	Exocrine ပန်ကရိယ	အူသိမ် lumen	Hydrolyzes triglycer- ဖက်တီးအက်ဆစ်ကိုမိုဝဲသည် နှင့် monoglycerides	ဖက်တီးအက်ဆစ်များနှင့် monoglycerides
	သည်းခြေဆားများ (တစ်ခုမဟုတ်အသည်း အင်ဇိုင်း)		အူသိမ် lumen	ကြီးမားတဲ့အဆီတွေကိုဖယ်ရှားပါ တိုက်ခိုက်ရန် globules များ ပန်ကရိယ lipase မှ	

- ဤခေါက်ထားသောမျက်နှာပြင်မှ projection များသည် microscopic finger-**villi** ဟုလူသိများသောခန့်မှန်းချက်များကဲ့သို့ အသားလွှာကိုနှုးညံ့စေသည် အသွင်အပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ၁၀ ဆတိုးပါ (• ပုံ ၁၆-၂၂) ။ villus တစ်ခုစီ၏မျက်နှာပြင်ကို epithe- ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ lial ဆဲလ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံအကျိအခွဲဆဲလ်များနှင့်ဖြတ်သွားသည်။
- သေးငယ်သည့်ဆံပင်ပုံစံခန့်မှန်းချက်များ၊ စုတ်တံဘောင်သို့မဟုတ်မိုင် crovilli သည်ဤ epithelial ဆဲလ်များ၏ luminal မျက်နှာပြင်မှပေါ်ထွက်လာသည်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ၂၀ ဆတိုးသည်။ epithelial ဆဲလ်တစ်ခုစီ ဒီ microvilli ၃၀၀၀ ကနေ ၆၀၀၀ အထိရှိတယ်၊ အဲဒါကမြင်နိုင်တဲ့ အဲလက်ထရွန်မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့်သာစစ်သည်။ အူသိမ်၊ zymes သည်ဤအမြေးပါးအတွင်းငင်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သည် brush နယ်စပ်

အားလုံး၊ ခေါက်များ၊ ဗီလီများနှင့်မိုက်ခရိုဗီလီများသည်သေးငယ်သည့်အပေါက်ကိုပေးသည် luminal မျက်နှာပြင်ဧရိယာရှိ testine သည်၎င်းထက်အဆ ၆၀၀ ပိုကြီးသည် ပြန့်ကားချပ်တစ်ခုစီတန်းထားသောအရွှည်နှင့်လုံးပတ်တူညီသောပြန့်တစ်ခုသည် မျက်နှာ။ အမှန်ဆိုလျှင်အူသိမ်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်သည်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည် အပြားလိုက်၊ ၎င်းသည်တင်းနစ်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။

Malabsorption (စုပ်ယူမှုအားနည်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ပျက်စီးခြင်း (သို့) လျှော့ချခြင်းကြောင့် အူသိမ်။ အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် **celiac disease** ဟုခေါသော **gluten enteropathy** ဒီသဘောတရားမှာ လူ၏အူသိမ်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအာရုံခံစားလွယ်သည် *gluten*၊ ဂျို။ မုယောစပါးနှင့်ကောက်၏ပရိုတင်းဓာတ်တို့ဖြစ်သည်။ ဒါတွေပါ ကောက်နှံထွက်ပစ္စည်းများသည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများတွင်တွင်ကျယ်စွာမြုပ်နှံထားသည်။ ဒီ အခြေအနေသည်ရှုပ်ထွေးသောခုခံအားကျဆင်းမှုဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ gluten သည်မှားယွင်းစေသော T-cell တုံ့ပြန်မှုကိုသက်ဝင်စေသည်မှာသေချာသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအူဗီလီ: ပုံမှန်အားဖြင့်ဝေဆာနေသောဗီလီများဖြစ်သည် လျော့နည်းသွားသည်၊ mucosa သည်ပြန့်ကားလာပြီး brush အနားသတ်ဖြစ်လာသည် တိုတိုနှင့်မာကျောလာသည် (• ပုံ ၁၆-၂၃) ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ပါ ဗီလီသည်စုပ်ယူနိုင်သောစုပ်ယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုလျော့ကျစေသည်။ အာဟာရဓာတ်အားလုံးချို့တဲ့သည်။ အခြေအနေအားဖြင့်ကုသသည် အစားအစာမှ gluten ကိုဖယ်ရှားသည်။

VILLUS စုပ်ယူမှုပုံစံ သည်အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်စုပ်ယူသည် နှုန်းတွင်ရွေ့လျားမှုနှင့်ဆင်တူသော transepithelial သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါ ဝ င်သည် ကျောက်ကပ်ပြွန်တစ်လျှောက်ရှိအရာများ (စာမျက်နှာ ၅၂၅ ကိုကြည့်ပါ) ။ ဗီလာတစ်ခုစီရှိသည် အောက်ပါအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို (ကြည့်ရှု• ပုံ 16-21c):

- *villus* ၏မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်သော *Epithelial* ဆဲလ်များ စာပို့ခံ- lial ဆဲလ်များသည်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းဆုံလမ်းခွများဖြင့်ငင်းတို့၏ဘေးဘက်နယ်နိမိတ်များတွင်ပေါင်းစည်းကြသည်။ ဆဲလ်များအကြား luminal ပါဝင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သေးငယ်သောအူလမ်းကြောင်းရှိတင်းကျပ်သောလမ်းဆုံများသည်ထက်ယိုစီးသည် အစာအိမ်ရှိသူများ သူတို့၏ luminal brush နယ်နိမိတ်များအတွင်း၌ဤအရာများရှိသည် epithelial ဆဲလ်များသည်သီးခြားအာဟာရများကိုစုပ်ယူရန်သယ်ဆောင်သူများရှိသည် lumen နှင့်အမြေးပါးမှ electrolytes များ။ ကစီဓာတ်နှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ကိုဖြည့်စွက်ပေးသောအစာခြေအင်ဇိုင်းများ tein အစာခြေ။
- တူယ်ဆက်တစ်သျှူးပင်မဖြစ်သည်။ ဤအမာခံကို lamina ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် မျိုးဆက်ဆက်။ ဒီ

စာမျက်နှာ ၄

ဧရိယာသုံးဆ။ (ဂ) ဗီလီဟုလူသိများသောအဏုကြည့်မှန်ကွဲသိုလက်ဖြင့်ရိုက်ခြင်း
စုပေါင်းမျက်နှာပြင်ကို ၁၀ ဆတိုးပေး။ (၂) ဇာတ်ကြောင်းတိုင်း
villus တစ်ခုတွင် thelial cell သည်၎င်း၏ luminal border တွင် microvilli ရှိသည်။ မိုက်ခရို
villi သည်မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ၂၀ ဆတိုးသည်။ အတူတူ၊ ဒီ
မျက်နှာပြုပြင်ခြင်းသည်အူသိမ်၏စုပ်ယူမျက်နှာပြင်ကိုတိုးစေသည်
ဧရိယာ ၆၀၀

သာမန်လူတစ် ဦး တွင်သေးငယ်သောအူလမ်းကြောင်း epithelial ဆဲလ်ရှိသည်။ (ခ) အီလက်ထရွန်
အူသိမ်အူသိမ်၏အတို၊ အဖျော့ဖြူးနယ်စပ်မျဉ်း၏ crograph
gluten enteropathy ရှိသောလူနာတစ် ဦး အတွက် thelial cell

(အရင်းအမြစ်: Thomas W. Sheehy, MD; Robert L. Slaughter, MD:
Medcom, Inc. မူပြန်လည် ထုတ်လုပ်ထားသော *Malabsorption Syndrome*
Medcom, Inc. ၏ခွင့်ပြုချက်)

စာမျက်နှာ ၅

- သွေးကြောမျှင်ကွန်ယက်တစ်ခု။ villus တစ်ခုစီကို arteriole တစ်ခုကထောက်ပံ့ထားပြီး၊ villus core အတွင်းမှသွေးကြောမျှင်များကွန်ယက်သို့ပြိုကွဲသည်။
- သွေးကြောမျှင်များသည်ပြန်လည်စီးဆင်းရန်ဝေးသောသွေးပြန်ကြောတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်စုဝေးကြသည်။ villus ။
- *terminal lymphatic* သဘော်။ villus တစ်ခုစီကို a ကထောက်ပံ့သည်

ဗဟိုချိပ် ဟုလူသိများသောတစ်ခုတည်းသော **မျက်ကြည်လွှာ** ဆုံးသွေးကြောသဘော်
စိမ်းပြာရောင် သည် villus core ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။

(စာမျက်နှာ ၄၅၄ ကိုကြည့်ပါ) ။
ial ဖြစ်သည့်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည်
အူသိမ်၏အမြှေးပါးသည်စုပ်ယူမှုကိုပြည့်စုံစေရန်အထူးပြုသည်။
luminal ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ငင်းမှတဆင့်ယန္တရားများ
ရာတ်သတ်မှတ်မှတ်အစားအစာများကိုပံ့မှန်အားဖြင့်စုပ်ယူသည်။

စုပ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ကြေညက်သောအရာဝတ္ထုများ ဝ ငရောက်သည် capillary network (သို့) lacteal ဗဟို စုပ်ယူရန်၊
အရာဝတ္ထုသည် epithelial cell မှတဆင့်လုံး ဝ ဖြတ်သွားရမည်၊
တွယ်ဆက်တစ်သျှူးအတွင်း interstitial fluid ကို ဖြတ်၍ ပေါင်းသည်
villus ၏အမာခံ၊ ထို့နောက်သွေးကြောမျှင်များ (သို့) lymph နံရံကိုဖြတ်သည်
သင်္ဘော ကျောက်ကပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့အူလမ်းကြောင်းစုပ်ယူမှုကိုတက်ကြွစွာစုပ်ယူခြင်းနှင့် passive ဖြစ်သည်
သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင်တက်ကြွစွာစုပ်ယူခြင်းနှင့် passive ဖြစ်သည်
အနည်းဆုံး transepithelial သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြေလှမ်းများအတွင်း။

mucosal membrane သည်လျှင်မြန်စွာလည်ပတ်နေသည်။

villi များအကြား mucosal မျက်နှာပြင်သို့ကျဆင်းလာသည်
Lieberkühn ၏ **crypts** ဟုလူသိများသောတိမ်တိုက်ကျူးကျော်မှုများ (ကြည့်ပါ
ပုံ ၁၆-၂၀) အစာအိမ်တွင်းနှင့်မတူဘဲကျွန်အူသိမ်များသည်
အစာခြေအင်ဇိုင်းများကိုမစွန့်ထုတ်ဘဲငင်းတို့သည်ရေနှင့်စွန့်ထုတ်သည်
ဆဲလ်များမထုတ်သောခွဲခြန်းနှင့်အတူ electrolytes၊
villus မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် succus entericus ကိုဖွဲ့စည်းသည်။

ထို့ပြင် crypts များသည်ကလေးထိန်းကျောင်းများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။ စာပိုဆဲလ်များအကြားဘေးဘက်နေရာများရှိ interstitial fluid
lial cells များသည်အူသိမ်အတွင်းပိုင်းကိုပိတ်။ ကြမ်းပြင်ခွဲအစားထိုးသည် ငင်းတို့သည်တင်းကျပ်သောလမ်းဆုံးလမ်းခွများနှင့်မပူးပေါင်းပါ။ interstitial fluid မှ၊
မြင့်မား mitotic လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်လျင်မြန်စွာမွှန်းနှင့် ကို *stem* ဆဲလ် ထဲမှာ Na + သည်သွေးကြောမျှင်များထဲသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။
crypts များ ဆဲလ်အသစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည် nephron ၏အစောပိုင်း၌ renal tubules နှင့်ကွဲသို့၊
crypts များသည် villi ကိုတက်စေပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အဟောင်းများကိုတွန်းထုတ်သည်Cl မှ ၂ , H ၂ O, ဂလူးကို့စ်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ကို စုပ်ယူ သည်
villi ၏အစွန့်အဖျားမှ lumen ထဲသို့ဆဲလ်များ ဤနည်းအားဖြင့်ပိုများသည် အူသိမ်သည်ဤစွမ်းအင်ကိုမှီခိုသော Na + စုပ်ယူမှု နှင့်ဆက်စပ်သည်။
တစ်မိနစ်လျှင်အူဆဲလ်ပေါင်းသန်း ၁၀၀ ထက်မနည်းကျသည်။ တစ်ခုလုံးကို သတ်မှတ်ချက် ကလိုရိုက်သည်လျှပ်စစ် gradient ကိုအောက်ပါအတိုင်းခိုင်းစေသည်
crypt မှ tip သို့ပျမ်းမျှသုံးရက်ခန့်သွားသောကြောင့် epithelial ဖြစ်သည် Na + စုပ်ယူမှု ဖြင့်ဖန်တီးပြီးဆင့်ပွား စုပ်ယူနိုင်သည်
အူသိမ်၏အတွင်းပိုင်းကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အစားထိုးသည် လိုအပ်လျင်တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလည်းရှိသည်။ H ၂ O အများစုကို စုပ်ယူသည်
သုံးရက်။ ဤဆဲလ်ခွဲမှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်ငင်းသည် crypt ဖြစ်သည် အစာခြေလမ်းကြောင်းသည် Na + ကိုစုပ်ပေးသော active carrier ပေါ်မူတည်သည်သည်
ပင်မဆဲလ်များသည်စောက်ရောင်ခြည်နှင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပျက်စီးမှုကိုအလွန်ထိခိုက်လွယ်ကူသောရာများသို့စုစည်းပြီးမြင့်မားသောရေငွေ့ဖိအား
ကင်ဆာဆေးများသည်ငင်းတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆဲလ်ခွဲခြင်းကိုဟန့်တားနိုင်သည်။ ဆဲလ်များအကြားရှိဒေသအတွင်း osmotic ဖိအား

ဆဲလ်အသစ်များသည်ရွှေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများစွာကိုခံရသည်ကျက်ကပ်၏အခြေအနေနှင့်ဆင်တူသည် (စာမျက်နှာ ၅၅၂ တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဒီဒေသခံ
ဗီလိန် brush-border အင်ဇိုင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်တိုးလာသည် ized မြင့် osmotic ဖိအား သည် lu ၂ မှ lu သို့ရွှေ့လျား စေသည်။
စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေသည်၊ ထို့ကြောင့်အစွန့်အဖျားရှိဆဲလ်များ လူများကိုဆဲလ်မှတဆင့် (နှင့် lumen မှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်
villus များ၏အစာချေဖျက်မှုနှင့်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ယို့စိမ့်သောလမ်းဆုံ) သည်ဘေးဘက်အာကာသထဲသို့ ရေထဲသို့ ဝ ငလာသည်
အင်း သူတို့၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါကျဆဲလ်များကိုအသစ်ကတွန်းထုတ်ခံရသည်။ osmotic ဖိအားကိုလျော့နည်းစေသော်လည်း hydrostatic ကိုမြင့်တက်စေသည်
ချွေးပြောင်းဆဲလ်များ ထို့ကြောင့် luminal အကြောင်းအရာများသည်အမြဲတစေရှိနေသည်။ ဖိအား။ ထို့ကြောင့် H ၂ O သည်ဘေးတိုက်မှုလျှံထွက်လာသည်
Di- ဖြည့်စွက်ရန်အကောင်းဆုံးတပ်ဆင်ထားသည့်ဆဲလ်များကိုပြသည်။ villus ၏အတွင်းပိုင်းသို့အာကာသမှကောက်ယူသည်
gestive နှင့်စုပ်ယူနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ဝင်ပြေးခြင်းအားဖြင့်ပြန်ထုတ်သည့်အတောအတွင်း Na + ကို ပို စုပ်ထုတ်သည်
အစာအိမ်၊ အူသိမ်ရှိဆဲလ်များလျင်မြန်စွာလည်ပတ်သည် lateral space သည် H ၂ O စုပ်ယူမှုကို ပိုမိုအားပေးသည် ။
ပြင်းထန်သော luminal အခြေအနေများကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆဲလ်ဟောင်းများ
abrasive နှင့် corrosive luminal အကြောင်းအရာများကို စုစည်း၍ အလွယ်တကူပြုလုပ်ခံရသည်
ပျက်စီးသွားပြီးရေရှည်မရှင်သန်နိုင်သဖြင့်ငင်းတို့သည်အစဉ်အမြဲရှိနေရမည်
မွေးကင်းစဆဲလ်များကိုလတ်ဆတ်သောထောက်ပံ့မှုဖြင့်အစားထိုးသည်။
lumen ထဲသို့ပိတ်သွားသောဆဲလ်ဟောင်းများသည်လုံးဝမဟုတ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံးသည်။ ဒီဆဲလ်တွေကိုချေဖျက်ပြီးဆဲလ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့
သွေးထဲသို့စုပ် ယူ၍ ပေါင်းစပ်ရန်ပြန်လည်ရယူသည်
ဆဲလ်အသစ်များ၊ အခြားအရာတို့တွင်

ပင်မဆဲလ်များအပြင် Paneth ဆဲလ်များကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်
crypts များ **Paneth ဆဲလ်** များသည်အကာအကွယ် function ကိုကာကွယ်ပေးသည်အဓိကအားဖြင့်ပုံစံများကိုစုပ်ယူရန်အူသိမ်သို့ပို့သည်
ပင်မဆဲလ်များထဲသို့ ၎င်းတို့သည်တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်သည် disaccharides maltose (polysaccharide di- ထုတ်ကုန်
ဘက်တီးရီးယား: (1) *lysozyme,* ထို့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ဘက်တီးရီးယား-lysing အင်နိုင်းသတ်ဖြတ်ခြင်း), sucrose နှင့် Lactose ကို (• ပုံ 16-24a) ။ မသက်ာစရာ

စာမျက်နှာ ၆

အစားအသောက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်

ဂလူးကို့စ် monomers

ပါးစပ်ထဲမှာ
နှင့်
အစာချေဖျက်မှု

ကစီဓာတ်, glycogen

Polysaccharides



အစာခြေစနစ် ၆၂

စာမျက်နှာ ၇

သေးငယ်သောထိတွေ့မှု၏ brush-border membrane ၌တည်ရှိသောဓာတ်များ tine ဆဲလ်များသည်ဤ disaccharides များကိုစုပ်ယူနိုင်သောနေရာတွင်ထပ်မံလျှော့ချပေးသည် monosaccharide သည်ဂလူးကို့စ်၊ galactose နှင့် fructose ဖြစ်သည်။

ဂလူးကို့စ်နှင့် galactose နှစ်ခုလုံးကိုဆင့်ကဲစုပ်ယူခြင်းဖြင့်စုပ်ယူသည်။ tive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆိုဒီယမ် ကဲ့သို့ symport သယ်ဆောင်သူများ *luminal* တွင် *glucose cotransporter (SGLT;* p ။ 73) ကိုကြည့်ပါ အမြေးပါးသည် monosaccharide နှင့် Na + နှစ်ခုလုံးကိုသယ်ဆောင် သည် lumen သည်အူဆဲလ်အတွင်းပိုင်းသို့ (ပုံ ၁၆-၂၄ b) ။ ဤထောက်ခံသူများ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်တိုက်ရိုက်မသုံးပါ စွမ်းအင်သည် Na + အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ပေါ်တွင်မူတည်သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအခြေခံ Na + JK + မှတည်ထောင်ခဲ့သည် စုပ်စက် (p ။ 70) ကိုကြည့်ပါ။ ဂလူးကို့စ် (သို့မဟုတ် galactose) သည်သန္ဓေတည်နေ့ (ပုံ ၁၆-၂၄ a) monosaccharides ကဲ့သို့အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အစာထဲသို့ ဝ င်ရောက်သည် ဤအထောက်ထားများကဆဲလ်အတွင်းခွံရှိသောဆဲလ်များကိုလင်း၏အောက်သို့စွန့်သည်။ အတွင်းသွေးကြောမျှင်များကွန်ရက် လွယ်ကူသောပျံ့နှံ့မှု (passive carrier- ကြားဖြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး; p ကိုကြည့်ပါ။ ၆၉) ဂလူးကို့စ်သယ်ယူပို့ဆောင်သူ *GLUT-* မှထုတ်ဆင့် basal border ၌ ၂ ယောက် က villus အတွင်းမှသွေးများကိုထည့်သည်။ ၌ ဂလူးကို့စ်များအပြင်ဆဲလ်မျှတစ်ဆင့်စုပ်ယူသည် ထောက်ခံသူ၏မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကသိသာထင်ရှားသည် ဂလူးကို့စ်ပမာဏသည် epithelial barrier ကို ဖြတ်၍ ဖြတ်သည် epithelial ဆဲလ်များအကြားယိုစိမ့်သောလမ်းဆုံများ

အဆင့်ပြေစေသောအခက်အခဲများမှ Fructose ကိုသွေးထဲသို့သာစုပ်ယူသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း။ ၎င်းသည် GLUT-5 မှတဆင့် lumen မှ epithelial ဆဲလ်များထဲသို့ နှင့် (ဤဆဲလ်တွေမှားယွင်းချ ခဲ့. -2 ကနေတဆင့်အသေးကိုရိုက်ထည့်မှထွက်သွားခဲ့ ၁၆-၂၄ ခ)

PROTEIN ABSORPTION ကို ပရိုတင်းများနှင့် endogenous နှစ်မျိုးလုံးစားသုံးသည် (ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း) အစာခြေလမ်းကြောင်းထဲသို့ ဝ င်လာသောပရိုတင်းများ အောက်ပါအရင်းအမြစ်သုံးခုမှ lumen ကိုကြေညက်သည် စုပ်ယူသည်

၁။ အ စာခြေအင်ဇိုင်းများ၊ ပရိုတိန်းများအားလုံးပါ ဝ င်သည်

tion gradient (ပုံ ၁၆-၂၅ b) H + gradient ကိုသတ်မှတ်ထားသည် ဆဲလ်များတွင်ရှိသော luminal membrane ရှိ antiporter တစ် ဦး မှ ဆဲလ်ထဲသို့ရွှေ့လျားသွားပြီးဂင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှု gradient နှင့် H + ကို ကျဆင်းစေသည် ဆဲလ်မှဂင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဟိ Na + အာရုံစူးစိုက်မှု gradient သည် antiporter ကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေသည် စွမ်းအင်ကိုမှီခိုသော Na + JK + စုပ်စက်ဖြင့်တည်ဆောက်သည် basolateral အမြေးပါး။ ထို့ကြောင့်ဂလူးကို့စ်၊ galactose၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ နှင့် peptides လေးများအားလုံးသည်စွမ်းအင် ex- တွင်“ အခမဲ့စီးနင်း” ကိုရရှိသည်။ Na + သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက်ဆိုင်းငံထားသည် ။ peptides လေးများသည်ပြိုကွဲသွားကြသည် aminopeptidases ၌ပါ ဝ င်သောသူတို့၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်များထဲသို့ brush-border membrane သို့မဟုတ် intracellular peptidases များဖြင့်ပြုလုပ်သည် အတွင်းသွေးကြောမျှင်များကွန်ရက်

[ကြေညက်တဲ့အဆီတွေကိုစုပ်ခိုင်းတာ lymph ထဲသို့ ဝ င်သည်။]

အဆီစုပ်ယူမှုသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတင်းတို့နှင့်အတော်လေးကွဲပြားသည် ရေ၌အဆီဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းသည်စုပ်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အထူးပြဿနာ။ အရည်ရွှမ်းသော chyme မှအဆီကိုလွှဲပြောင်းပေးရမည် အဆီသည်ရေမဟုတ်သော်လည်းစိုထိုင်းသောခန္ဓာကိုယ်အရည်များမှတစ်ဆင့် ဒါကြောင့်အဆီတွေကိုကာယပိုင်းနဲ့ဆက်တိုက်ခံရတယ် •ဆုံတုပြောင်းလဲမှုများသည်ယင်းကာလအတွင်းဂင်း၏ပြဿနာကိုရှောင်တိမ်းရန်ဖြစ်သည် အစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှု (ပုံ 16-26) ။

အဆီဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အစာခြေဖျက်ခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ် သည့်အခါ အစာအိမ်၌အရာများကို duodenum ထဲသို့စုပ်ယူသည် အဆီသည်မျှော။ အဆီများသော triglyceride အစက်များသို့စုစည်းသွားသည် chyme ၌ သည်းခြေဆား၏ဆပ်ပြာရည်မှတဆင့်သတိရပါ။ အူသိမ်၏ lumen အတွင်းခွံကြီးမားသောအစက်အပြောက်များသည်

lumen ထဲသို့လျှို့ဝှက်
၂။ ဗီလီမှထုတ်ယူထားသောဆဲလ်များအတွင်းမှပရိုတင်းများ
mucosal turnover ဖြစ်စဉ်တွင် lumen ထဲသို့

၃။ ပုံမှန်အားဖြင့်ယိုစိမ့်သောပလာစမာပရိုတိန်းပမာဏအနည်းငယ်
သွေးကြောမျှင်များသည်အစာခြေလမ်းကြောင်း lumen သို့

endogenous protein ၂၀ မှ ၄၀ ဂရမ်ခန့်သည် lumen တစ်ခုစီသို့ ဝ င်သည်
ဒီအရင်းအမြစ်သုံးခုကနေနေ့ ဒီပမာဏကပိုများနိုင်ပါတယ်
စားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေမှာပရိုတင်းပမာဏထက် အားလုံး endogenous
ပရိုတင်းများကိုအစာနှင့်အတူစုပ် ယူ၍ စုပ်ယူရမည်
ခန္ဓာကိုယ်မှပရိုတင်းများကုန်ခမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ပရိုတင်းများ ဟိ
အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုအစာအစာနှင့် endogenous protein နှစ်မျိုးလုံးမှစုပ်ယူသည်
ခန္ဓာကိုယ်၌ပရိုတင်းအသစ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။

စုပ်ယူမှုအတွက်အသိမ်သိုတင်ပြထားသောအသားဓာတ်
အဓိကအားဖြင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့် peptide အနည်းငယ်တို့ဖြစ်သည်
အိုင်းအစများ (• ပုံ ၁၆-၂၅ က) အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုအနှံ့စုပ်ယူသည်
ဂလူးကို့စ်နှင့်ဂယ်လက်စ်တို့ကဲ့သို့ထောက်ခံသူများမှအူဆဲလ်များ
tose စုပ်ယူမှု (• ပုံ ၁၆-၂၅ ခ) ။ သကြားထောက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်
အမိုင်နိုအက်ဆစ်ထောက်ခံသူများနှင့်အမိုင်နိုအက်စစ်တို့ကဲ့ပြားသည်
ထောက်ခံသူများသည်ကဲ့ပြားခြားနားသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များအတွက်ရွေးချယ်သည်
ဒီရေသည်အခြား Na + -dependent carrier တစ်ခုအားဖြင့် ဝ ငရောက်နိုင်သည်
tertiary active transport (*tertiary* mean-) ဟုခေါသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်
နောက်ဆုံးတတိယဖြစ်ခြင်းအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းပြီး“ တတိယ” ကိုရည်ညွှန်းသည်
ပထမအဆင့်တွင်သုံးသောစွမ်းအင်ဖြင့်မောင်းနှင်သည် ။) ဤကိစ္စတွင်သင်္ကေတ
အထမ်းသမားသည် H + နှင့် peptide နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်သယ်ယူ သည်
lumen သည်ဆဲလ်အတွင်းသို့ H + ရွှေ့လျားသွားပြီးငင်း၏သန္ဓေသားအောက်သို့ရွှေ့လျားခွင့်ပြုသည်
tration gradient နှင့် peptide သည်ငင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆန့်ကျင်သည့်ရွှေ့လျားခွင့်ပြုသည်

ခန်းဆီယိုသွပ်အမှုန်းဖြင့်အများအားဖြင့်ဖျက်ပိုးပိုးကောင်းမွန်စွာဆွဲဆောင်ခံရသော်လည်းဖြစ်ရပြီးအခါဆီပို
pase lipase အစာခြေဖျက်မှုထုတ်ကုန်များ (monoglycerides နှင့်
free fatty acids) သည်ရေတွင်အလွန်ပျော်ဝင်နိုင်သဖြင့်အလွန်နှုန်းသည်
ဤအဆီချေဖျက်မှု၏ဤနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များသည်ပြန့်နှံ့နိုင်သည်
aqueous chyme သည်စုပ်ယူနိုင်သောအမြေးပါးသို့ရောက်သည်။ သို့သော် biliary
အစိတ်အပိုင်းများသည်ဤဖက်တီးအဆုံးထုတ်ကုန်များကိုစုပ်ယူမှုလွယ်ကူစေသည်
micelles များဖွဲ့စည်းခြင်း

FAT ABSORPTION micelles များသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်သည့်ကိုသတိရပါ
အဆီချေဖျက်နိုင်သောအဆုံးထုတ်ကုန်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောအမှုန်များ
သူတို့၏ lipid ပျော်ဝင်နိုင်သောအတွင်းပိုင်း ဤ micelles များသည် lumi သို့ရောက်သည်နှင့်
epithelial ဆဲလ်များ၏ nal အမြေးပါးများ၊ monoglycerides နှင့်
free fatty acids များသည် micelles များမှတဆင့်ပျံ့နှံ့သွားသည်
epithelial ဆဲလ်အမြေးပါးများ၏ lipid အစိတ်အပိုင်း
ဤဆဲလ်များ၏အတွင်းပိုင်း ဤအဆီထုတ်ကုန်များသည် micelles မှထွက်ခွာသည်
ငင်းကို epithelial ဆဲလ်အမြေးပါးများတွင်စုပ်ယူသည်။
ဆဲလ်များသည် monoglycerides နှင့် free fatty acids များပိုမိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
အခြား triglyceride ကိုအစာခြေဖျက်ခြင်းမှထုတ်လုပ်သည်
အဆီ emulsion ၌မော်လီကျူးများ
ထုတ်ဖြန့်ခြေဆေးများသောငင်းတို့၏အဆီပျော်စေသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဆက်မပြတ်ပြန်လုပ်သည်
အဆီအားလုံးကိုစုပ်ယူသည်အထိအူသိမ်၏အရှည်ကိုလျှောချပါ။
ထိုနောက်သည်းခြေရည်ကိုငင်းတို့ကိုယ်တိုင် terminal တွင်ပြန်လည်စုပ်ယူသည်
ileum အားအထူးတက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒါကထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ
သည်းခြေဆားအနည်းငယ်မျှဘာပါ ဝ ငသောကြောင့်လွယ်ကူစေသည်။
သည်းခြေတစ်ခုစီနှင့်အဆီပမာဏများစွာကိုစုပ်ယူခြင်း
ကျွေးကြောင်းများသည်ဤအရာများ၏ကိုးတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမပြန်မီအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်သည်။

စာမျက်နှာ ၈



•ပုံ ၁၆-၂၅ ပန္ကရိယ lipase ကြောင့်တိုက်ခိုက်နိုင်သောနေရာ

စာမျက်နှာ ၉

•ပုံ ၁၆-၂၆ အ ဆီချေဖျက်မှုနှင့်စုပ်ယူမှု အဆီသည်ရေတွင်မပျော် ဝ င်သောကြောင့်ဝင်းသည်လိုအပ်သည် အစာကိုချေဖျက်ရန်နှင့်စုပ်ယူနိုင်ရန်အသွင်ပြောင်းမှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

epithelial cells များ၏အတွင်းပိုင်းတွင် mono-glycerides နှင့် free fatty acids တို့ကို triglycerus အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ides ။ ဤ triglycerides များသည်စုပုံထားသောအမှုန်အမွှားများနှင့်ဖြစ်ကြသည် endoplas မပေါင်းစပ်ထားသော lipoprotein တစ်လွှာနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ epithelial cell ၏ mic reticulum) သည်အဆီကျစေသည်၊

ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအဆီစက်များဟုလူသိများသည် **chylomicrons** များသည် epithelial မှ exocytosis ကြောင့် extruded ဖြစ်သည် ဆဲလ်များသည် villus အတွင်း interstitial fluid ထဲသို့ Chylomicrons အချင်း ၇၅ မှ ၅၀၀ nm ရှိပြီးငင်းသည် micelles များနှင့်နိုင်းယှဉ်သည် အချင်း ၃ မှ ၁၀ nm chylomicrons များသည်နောက်ပိုင်းတွင် ဝ င်လာသည်

စာမျက်နှာ ၁၀





•ပို ၁၆-၂၇ သံဓာတ်စုပ်ယူမှု

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးကြောမျှင်လေးတွေထက် central lacteals တွေပါ
ဤသော်နှစ်ခင်း၏ဝတည်ဆောက်ပုံကွာခြားချက်များ သွေးကြောမျှင်များ
မြေအောက်ခန်းအမြွေးပါး (polysaccharides ၏အပြင်ဘက်အလွှာ)
(p ။ ၃၆၁ ကိုကြည့်ပါ) chylomicrons များ ဝ ငရောက်ခြင်းကိုတားဆီးသော်လည်း၊
lymph သဘော်တွေမှာဒီအတားအဆီးမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်အဆီစုပ်ယူနိုင်သည်
lymphatics ထဲသို့သော်လည်းကောင်း၊ သွေးထဲသို့တိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်ပါ။

monoglycerides ကိုအမှန်တကယ်စုပ်ယူခြင်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်း
chyme ၏ luminal အမြွေးပါးကို ဖြတ်၍ chyme မှအခမဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်များ
အူသိမ် epithelial ဆဲလ်များကိုအစဉ်အလာအားဖြင့်ယူဆသည်
passive process ဖြစ်သောကြောင့် lipid-soluble fatty end products များဖြစ်သည်
အရည်ပျော်ဝင်ပြီးမှတ်ဉာဏ်၏ lipid အစိတ်အပိုင်းကိုဖြတ်သွားသည်။
brane ။ သို့သော်အဆီအတွက်လိုအပ်သောအဖြစ်အပျက်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
စုပ်ယူမှုသည်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သည်းခြေဆားများသည်
အသည်းမှလျှို့ဝှက်စွာ၊ triglycerides ၏ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှုနှင့်
epithelial ဆဲလ်များအတွင်း chylomicrons ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်တက်ကြွနေသည်
ဖြစ်စဉ်များနှင့် chylomicrons များ၏ exocytosis သည်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။

ဒီတာမင်စုပ်ယူမှုသည်အလွန်နည်းသည်။

ရေတွင်ပျော်ဝင်သောဗီတာမင်များကိုအဓိကအားဖြင့်စုပ်ယူသည်
ရေ၊ အဆီတွင်ပျော်ဝင်သောဗီတာမင်များကို micelles တွင်သယ်ဆောင်သည်
အဆီချေဖျက်မှု၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အတူစုပ်ယူသည်။
လိုအပ်သောဗီတာမင်အချို့ကိုသယ်ဆောင်သူများကစုပ်ယူနိုင်သည်။
sary ပါ။ ဗီတာမင် B_{12} သည်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ထူးခြားသည်
receptor-mediated ဖြင့်စုပ်ယူရန်အစာအိမ်၏ပင်ကိုယ်အချက်နှင့်အတူ
terminal ileum ၌ endocytosis

သံဓာတ်နှင့်ကယ်လ်စီယမ်စုပ်ယူမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ပြီးပြည့်စုံလုံးပါးစည်းမျဉ်းမဲ့စုပ်ယူမှု
အခြားစားသုံးသော electrolytes များ၊ သံဓာတ်နှင့်ကယ်လ်စီယမ်မပါရှိပါ
သူတို့၏စုပ်ယူမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ရှိနေသောကြောင့်လုံးဝစုပ်ယူသည်။
ဤသည် electrolytes များအတွက်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်။

IRON ABSORPTION သံဓာတ်သည်ဟေမိုဂလိုဘင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သတ်မှတ်ချက် ပုံမှန်သံဓာတ်စားသုံးမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ မှ ၂၀ မီလီဂရမ်/တစ်ရက်ဖြစ်သည်
လူသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၀.၅ မှ ၁ မီလီဂရမ်သို့သွေးထဲသို့စုပ်ယူသည်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် ၁.၀ မှ ၁.၅ မီလီဂရမ်တွင်အနည်းငယ်ပိုယူသည်
မီးယပ်သည်ရာသီလာစဉ်သံဓာတ်ဆုံးရှုံးသောကြောင့်သံဓာတ်ပိုလိုအပ်သည်
သွေးစီးဆင်းမှု) ။

သံဓာတ်စုပ်ယူရာတွင်အဓိကအဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်
သွေး၊ (၁) lumen မှသံအားစုပ်ယူခြင်း
အူလမ်းကြောင်းရှိ epithelial ဆဲလ်များနှင့်သံဓာတ်စုပ်ယူခြင်း (၂)
ထိုအသွေးသို့ epithelial cells (• ပို 16-27) ။

သံအား lumen မှ epithe- သို့ epithe- သို့ပို့ဆောင်သည်။
lial ဆဲလ်များသည်အမျိုးသမီးများထက်လေးဆပိုမိုတက်ကြွသည်။
သံထက်လွန်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာများ စားသုံးမိသည့်အတိုင်းအတာ
သံဓာတ်သည်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်
သံဓာတ်လောင်ကျွမ်းသည်။ သံဓါတ်ဓါတ်သည် *heme iron*၊ in
သံဓာတ်ကို hemeျ၊o- တွင်တွေ့ရသော heme အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ချည်နှောင်ထားသည်။
bin (p ။ ၃၉၃) ကိုကြည့်ပါ၊ အသား၊ *inorganic* သံ၊
အပင်များတွင်ရှိသည်။ heme ဓါတ်သည်စုပ်ယူမှုကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။
inorganic သံထက် ciently ဖြစ်သည်။ သံဓာတ်ပါ ဝ ငသောအာဟာရဓါတ်များရှိသည်

စာမျက်နှာ ၁၁

အဓိကအားဖြင့် oxidized ferric iron (Fe^{3+}) ပုံစံတွင်ရှိသော်လည်း၊
Duced ferrous iron (Fe^{2+}) ပုံစံသည်ပိုမိုစုပ်ယူလွယ်သည်။ ဓါတ်စာ
Fe^{3+} ကို Fe^{2+} သို့ အမြွေးပါးမှချည်ထားသောအင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြင့် လျှော့ချ သည်
စုပ်ယူမှုမပြုမီ luminal အမြွေးပါး။ အခြားရှိနှုန်း
lumen ရှိအရာများသည်သံဓာတ်အားမြှင့်တင်ခြင်းသို့လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
စုပ်ယူမှု။ ဥပမာအားဖြင့်ဗီတာမင်စီသည်သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
အဓိကအား Fe လျှော့ချခြင်းဖြင့် Fe^{3+} Fe မှ Fe^{2+} ။ ဖော့စဖိတ်နှင့် oxalate တို့ပါဝင်သည်
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်မပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေစေရန်သံဓာတ်နှင့်ပေါင်းစပ်
စုပ်ယူနိုင်သောဆားများ

Heme သံနှင့် Fe^{2+} တို့ကို luminal ကို ဖြတ်၍ သယ်ဆောင်သည်
စုတ်တံ၌သီးခြားစွမ်းအင်မိုခိုသယ်ဆောင်သူများဖြင့်အမြွေးပါး
နယ်နိမိတ်: Heme သံသည် *heme* သယ်ဆောင်သူ မှအူလမ်းကြောင်းထဲသို့ ဝ ငရောက်
tein 1 နှင့် Fe^{2+} ကို *divalent metal transporter 1* မှတဆင့်သယ်ဆောင်သည် ။
+2 ၏ valence ပါသောအခြားသတ္တုများကိုလည်းသယ်ဆောင်သည်။ တစ်ခုရှိတယ်ထုတ်ကုန်များသည်ချက်ချင်းဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲကိုကြုံတွေ့ရသည်။ သားမွေး
ဆဲလ်အတွင်းမှအင်ဇိုင်းသည်သံဓာတ်ကို heme complex မှလွတ်စေသည်။
အူသိမ်ရှိ epithelial ဆဲလ်များထဲသို့စုပ်ယူပြီးနောက်၊
သံ၌ဖြစ်နိုင်သောကံကြမ္မာနှစ်ခုရှိသည်။

၁။ သွေးနီဥများထုတ်လုပ်ရန်သံဓာတ်လိုအပ်သည်
ရိုးတွင်းခြင်ဆီသို့ပို့ဆောင်ရန်သွေးထဲသို့စုပ်ယူသည်
သွေးနီဥထုတ်လုပ်သည့်နေရာ သံဓာတ်သည်အူသိမ်မှထွက်သည်
fer- ဟုခေါသောအမြွေးပါးသံ transporter မှတဆင့် epithelial cell
roportin ။ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကိုမကြာသေးဖီကထိန်းချုပ်ထားသည်
အသည်းမှထုတ်လွှတ်သော **hepcidin** ဟော်မုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
ခန္ဓာကိုယ်မှာသံဓာတ်ပမာဏအရမ်းမြင့်လာတဲ့အခါ Hepcidin ကြိုတင်ဆေး
အူသိမ်ရှိ epithelial cell မှသံဓာတ်ပိုမိုထုတ်လွှတ်သည်
ferroportin နှင့်ပေါင်းပြီးငင်းအားမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သွေးထဲသို့
endocytosis နှင့်ငင်း၏နောက်ဆက်တွဲအားဖြင့်ဆဲလ်အတွင်းပိုင်းသို့ ဝ ငရောက်ခြင်း၌ငင်းနှင့်အဆိပ်သင့်နောက်ဆုံးတွင် ဝ ငရောက်နိုင်သည်
lysosomes ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း ထို့ကြောင့် hepcidin သည်မှုလစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။သွေးသို့ စုပ်ယူထားသောအဆိကို systemic circula မှသယ်ဆောင်သည်။
သံ homeostasis ၏ tor ။ hepcidin ချို့တဲ့ခြင်းသည်တစ်သျှူးများသို့ ဦး တည်သည်
ferroportin သည်သံအားဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့်သံဓာတ်လွန်ကဲခြင်း

သုံးပုံတစ်ပုံသည်အူသိမ်တွင်စုပ် ယူ၍ ကျန်များဖြတ်သန်းသွားသည်
မစင်အတွင်းမှထွက်သည်။

စုပ်ယူနိုင်သောအာဟာရအများစုသည်ချက်ခြင်းကုန်သွားသည့် လုပ်ဆောင်ရန်အသည်းမှတဆင့်

ငင်းနှင့်အတူအူသိမ်ဗီလီမှထွက်ခွာသော venules များ
အစာခြေလမ်းကြောင်း၏ကျန်နေရာမှ hepatic portal သို့အလွတ်မရ
သွေးသည်အသည်းသို့ပို့ဆောင်ပေးသောသွေးပြန်ကြောဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်ကဘာမဆို
အစာခြေလမ်းကြောင်းသွေးကြောမျှင်များထဲသို့စုပ် ယူ၍ ဦး စွာဖြတ်သွားရမည်
hepatic biochemical စက်ရုံသည်အထွေထွေလည်ပတ်မှုထဲသို့မ ဝ ငမီ
ထိထိရောက်ရောက်ချက် ထို့ကြောင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အသားဓာတ်ပါသောထုတ်ကုန်များသည်အစာကြေသည်
ဤစွမ်းအင်များစွာကြွယ်ဝသောအသည်းသို့စီးဆင်းသည်
thermore၊ စုပ်ယူနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောအရာများသည်
အထွေထွေပတ် ဝ နံးကျင်သို့မ ဝ ငမီအသည်းမှအဆိပ်အတောက်
lation ။ ပေါ်တယ်လည်ပတ်မှုကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်သွေးပြန်ကြောများထွက်သည်
အစာခြေစနစ်မှသွေးသည် vena cava သို့စီးဆင်းသည်
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့ဖြန့်ဝေရန်နှလုံးသို့ပြန်လာသည်။
တစ်သျှူးများအတွက်သုံးရန်ဂလူးကို့စ်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များထည့်သွင်းသည်။
အူလမ်းကြောင်းသွေးကြောမျှင်များကိုမထိုးဖောက်နိုင်သောအဆီသည်
central lacteal မှကောက်ယူပြီး lymphatic system ထဲသို့ ဝ ငသည်
ငင်းအစား hepatic portal စနစ်ကိုကျော်ဖြတ်သည်။ စာချုပ်များ
villi ကိုကြွက်သား mucosa ဖြင့်အခါအားလျော်စွာပြီးအောင်လုပ်သည်
အလယ်ပိုင်း lacteal နှင့်" ခို" lymph ကိုဤအရာမှချုပ်ပါ
သဘော် lymph သွေးကြော များသည်နောက်ဆုံးတွင် *tho* အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားသည်။
racic duct, သွေးပြန်ကြောထဲသို့အ မြုပ်ထွက်နေသော lymph သွေးကြောကြီးဖြစ်သည်
ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း ထို့ကြောင့် hepcidin သည်မှုလစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။သွေးသို့ စုပ်ယူထားသောအဆိကို systemic circula မှသယ်ဆောင်သည်။
homeostasis ၏ tor ။ hepcidin ချို့တဲ့ခြင်းသည်တစ်သျှူးများသို့ ဦး တည်သည် အသည်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားတစ်သျှူးများသို့ဆက်သွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်
ferroportin သည်သံအားဆက်လက်လွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့်သံဓာတ်လွန်ကဲခြင်း အသည်းသည်ကြေညက်ထားသောအဆိပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်၊ သို့သော်မပြီးမချင်း

ထိန်းချုပ်မှုရှိသော ဆဲလ်များကို ထုတ်လာသော သံဓာတ်သည် trans
trans ဟုခေါ်သော ပလာစမာပရိုတိန်းသယ်ဆောင်သူတစ် ဦး ကသွေးထဲသို့ပို့ဆောင်သွားပြီး
ferrin စုပ်ယူထားသောသံကို hemo- ပေါင်းစပ်မှုတွင်သုံးသည်။
အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသောသွေးနီဆဲလ်များအတွက် globin

၂။ ချက်ချင်းမလိုအပ်သောသံကိုအတွင်း၌ပြောင်းပြန်သိမ်းထားသည်
အူသိမ်ရှိ epithelial ဆဲလ်များကို **fer-** ဟုခေါ်သောအ **ပျော့** ပုံစံ
သွေးထဲသို့မစုပ်ယူနိုင်သော **ritin** သံအဖြစ်သိုလှောင်ထားသည်
ferritin သည် epithelial ဆဲလ်များကဲ့သို့သုံးရက်အတွင်းမစင်၌ဆုံးရှုံးသည်
ဤအမှုန်များပါ ဝ ငသောအရာများသည် mucosal re- ပြန်နေစဉ်
မျိုးဆက်။ မစင်တွင်သံအမြောက်အများကသူတို့ကိုအမှောင်ထုကိုပေးသည်။
black နီးပါးအရောင်။

ကယ်လ်ဆီယမ် **စုပ်ယူမှု** ကယ်လစီယမ် (Ca ²⁺) ပမာဏ
sorbed ကိုလည်းထိန်းညှိသည်။ ကယ်လ်စီယမ်သည် luminal membrane ထဲသို့ ဝ ငသွား
အူသိမ်ရှိ epithelial ဆဲလ်များကငင်း၏လျှပ်စစ်ဓာတုပစ္စည်းကိုကျဆင်းစေသည်
အထူးပြု Ca ²⁺ ချန်နယ် မှတဆင့် gradient သည်အတွင်း၌ကူးသည်
ဆဲလ်တစ်ခုသည် Ca ²⁺ -binding protein, **calbindin** နှင်ထွက်သည်
စွမ်းအင်ကိုမှီခိုသောယန္တရားနှစ်ခုဖြင့် basolateral အမြေးပါး
primary active transport Ca ²⁺ ATPase pump နှင့် secondary တစ်ခုဖြစ်သည်
တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Na ⁺ JCa ²⁺ antiporter ဗီတာမင် D သည်များစွာ
Ca ²⁺ စုပ်ယူမှု ၌ဤအဆင့်များအားလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗီတာမင်ဒီရရှိခင်ပါတယ်
ငင်းကိုအသည်းနှင့်အသက်သွင်းပြီးမှသာဤကျန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်ပါ
ကျောက်ကပ်ကို parathyroid ဟော်မုန်းဖြင့်ဖြင့်တင်ပေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
သင့်လျော်စွာ parathyroid ဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုသည်တိုးလာသည်
သွေး ၌ Ca ²⁺ အာရုံစူးစိုက်မှု ကျဆင်းခြင်းကိုတုံ့ပြန်သည် ။ သာမန်၊
ပျမ်းမျှ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် Ca ²⁺ ကိုနေ့စဉ် ၂ လုံးခန့်သာ သောက်သည်

ပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာ ဆဲလ်များကစုပ်ယူသည်။ ဤအဆင့်တွင်
ခန္ဓာကိုယ်ကအစာခြေရည်တွေမဆုံးရှုံးပါဘူး။ မဲဆန္ဒနယ်မြေများ၏နောက်တွင်
အရည်များသည်အစာခြေလမ်းကြောင်း lumen ထဲသို့လျှို့ ဝ ငသည်။
သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွဲ့စည်း၍ ၎င်းတို့သည်ပလာစမာသို့ပြန်သွားသည်။ တစ်နေ့တာ
ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သော secretory ထုတ်ကုန်သည် bilirubin, a
စွန့်ပစ်ရမည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

အစာအိမ်တို့တွင်ဇီဝဓာတုဟန်ချက်၊ ပန်ကရိယနှင့်အူသိမ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လျှို့ဝှက်အရည်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစာထဲသို့ပြန်စုပ်ယူသည်ကို
ပလာစမာ၊ ခန္ဓာကိုယ်၏အက်ဆစ်ဂျေဘွေစ်ဟန်ချက်ကိုမပြောင်းလဲပါ
အစာခြေဖြစ်စဉ်များ။ အူသိမ် lumen အတွင်း၌ HCl ရှိသည်
အစာအိမ်၏ parietal ဆဲလ်များမှထုတ်လွှတ်သောအရာသည် neutralized ဖြစ်သည်
ပန်ကရိယပြွန်ဆဲလ်များမှထုတ်လွှတ်သော NaHCO ₃

$$HCl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + H_2CO_3$$

ထွက်ပေါ်လာသော H_2CO_3 သည် $CO_2 + H_2O$ သို့ပြိုကွဲသွားသည် ။

$$H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

ဤတို့ပြန်မှုများ၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ - Na^+, Cl^-, CO_2, နှင့်
H_2O - အားလုံးကိုအူ epithelium မှစုပ်ယူသည်
သွေး။ ထိုကြောင့်ဤတို့ပြန်မှုများမှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်
ငင်းကာလအတွင်းအက်စစ်သို့မဟုတ်အခြေခံအသားတင်အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုမခံစားရပါ
အစာခြေ။

ပမာဏများစွာဆေးဖြင့်ရရှိပြီးလျှင်ပို့မဂ်မှုခွဲသေးမှုအဆီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနိုင်တဲ့သူ့
တစ်နာရီအတည်းမှာထိန်းထားနိုင်တာထက်အဆီပုံတွေနဲ့ချိန်းတွေ့တယ်။

အူသိမ်မှကျယ်ပြန့်သောစုပ်ယူမှု စွန့်ပစ်ခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

အူသိမ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အရည်တစ်လီတာလျှင် ၉ လီတာခန့်စုပ်ယူသည်
နေ့ကို H_2O ပုံစံ နှင့်စုပ်ယူနိုင်သောအရာအပါအဝင်၊
အာဟာရ၊ ဗီတာမင်များနှင့် electrolytes ယူနစ်များ။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ၊
လူသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အရည် ၁၅၀ မီလီလီတာခန့်ကိုသာစားသုံးကြသည်
အစာအခဲ ၁၅၀ ဂရမ် (၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် H_2O) တစ်နေ့လျှင် စားသုံးပါ
(စာမျက်နှာ ၅၆၆ ကိုကြည့်ပါ။) ▲ ဇယား ၁၆-၇ သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေ့စဉ်ဘ ဝ ကိုဖော်ပြသည်။
sorption ကိုအူသိမ်မှလုပ်ဆောင်သည်။ နေ့စဉ် ၉၅၀၀ လောက်ရှိတယ်
ml နှင့်ချေဖျက်ပြီးအူသိမ်ထဲသို့ ဝ ငသည်။ ဒီအချက်ကိုသတိပြုပါ
၉၅၀၀ မီလီလီတာ၊ ၂၅၀၀ မီလီလီတာကိုသာပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှစားသုံးသည်။
ment ။ ကျန်သောအရည် ၇၀၀၀ မီလီလီတာ (၇ လီတာ) သည်အစာခြေဖျက်သည်
ပလာစမာမှရရှိသောအရည်များ ပလာစမာသည်အဆုံးစွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ
အိမ်ထောင်ဖက်၏အစာခြေဖျက်မှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ထို secretory ဆဲလ်များသည်
ၾင်းတို့အတွက်လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများကိုပလာစမာမှထုတ်ယူသည်
secretory ထုတ်ကုန်။ ပလာစမာအလုံးစုံပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်
၂.၇၅ လီတာခန့်သာစုပ်ယူမှုကိုနီးကပ်စွာအပြိုင်ပြုလုပ်ရမည်
plasma ထုထည်ကိုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်။
အရည် ၉၅၀၀ မီလီလီတာမှအူသိမ် lumen သို့ ဝ ငသည်
တစ်နေ့လျှင် ၉၅%(သို့) အရည် ၉၀၀၀ ml ကိုပုံမှန်အားဖြင့်စုပ်ယူသည်
အူသိမ်သည်ပလာစမာသို့ ၅၀၀ မီလီလီတာသာပါ ဝ ငသည်
အူသိမ်များပါဝင်သောအရာများသည်အူမကြီးထဲသို့ဖြတ်သန်းသည်။ ထို့ကြောင့်

စာမျက်နှာ ၁၂

▲ TABLE 16-7 **Volumes များစုပ်ယူသည့် အကြီးနှင့်အသေးအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင်အူလမ်းကြောင်း**

တစ်နေ့လျှင်အူသိမ်ထဲသို့ပမာဏတိုးသည်		
မျိုချမိသည်	အစာစားပြီးပြီ	၁၂၅၀ ဂရမ်*
	အရည်များမူးလာသည်	၁၂၅၀ မီလီလီတာ
အရင်းအမြစ်များ	တံတွေး	၁၅၀၀ မီလီလီတာ
	အစာအိမ်ဖျော်ရည်	၂၀၀၀ မီလီလီတာ
	ပန်ကရိယဖျော်ရည်	၁၅၀၀ မီလီလီတာ
	သည်းခြေ	၅၀၀ မီလီလီတာ
	အူဖျော်ရည်	၁၅၀၀ မီလီလီတာ
		၉၅၀၀ ml
တစ်နေ့လျှင်အူသိမ်မှစုပ်ယူသောပမာဏ		၉၀၀၀ မီလီလီတာ
အသံသေးသေးလေးမှအူမကြီးထဲသို့ ဝ ငလာသည်		၅၀၀ မီလီလီတာ
တစ်နေ့လျှင်အူလမ်းကြောင်း		
တစ်နေ့လျှင်အူမကြီးမှစုပ်ယူသောပမာဏ		350 ml ကို
တစ်နေ့လျှင်စစ်ပမာဏ ၁၅၀ ဂရမ်*		

*H_2O တစ်လီတာ၏ အလေးချိန်သည် ၁ ဂရမ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းမြှင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်
အစားအစာနှင့်မစင်သည် H_2O၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အစားအစာသို့မဟုတ်မစင်ဂရမ်ကိုညီမျှစေခိုင်းသည်
အရည်၏မီလီလီတာနှင့်အတူ

ကနေရာယူပါ။ ငါတို့ကအန်တာနဲ့ခွဲတာကိုပြောပြီးပြီ။
အက်ဆစ်ဓာတ်ပါ ဝ ငသောအစာအိမ်ပါဝင်မှုများကို quent ဆုံးရှုံးခြင်းသည် metabolic alka-
losisis အစာအိမ်လှုပ်ရှားနိုင်မှုအပိုင်း။ အခြားအဖြစ်များသော
သားအိမ်လမ်းကြောင်းအနောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရည်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်
acidJbase မညီမျှမှုသည် **ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်သည်။** ဒီအခြေအနေကဓာတ်ကောင်
များသောအားဖြင့်အလွန်အမင်းအရည်များနေသောဝမ်းသွားခြင်းကိုဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
မစင်စွန့်ခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျော့ကျစေသည်။ အော့အန်ခြင်းကဲ့သို့ပင်၊
ဝ မ်းလျှောခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဝမ်းလျှောသည်
အူကိုလျင်မြန်စွာစွန့်ထုတ်လိုက်လျှင်အကျိုးရှိသည်။
ခန္ဓာကိုယ်မှအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ သို့သော်မသာ
မျိုချမိသောပစ္စည်းအချို့သည်သို့လောင်ထားသော်လည်းအချို့မှာပျောက်ကွယ်သွားသည်
ပုံမှန်အားဖြင့် reabsorbed ခံရမယ့်ပစ္စည်းတွေကပျောက်သွားတယ်
ကောင်းပြီ။ အူလမ်းကြောင်းများအလွန်အကျွံဆုံးရှုံးခြင်းသည်ရောဂါခံမ်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
အဟာရဓာတ်များဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် metabolic acidosis ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော
HCO_3 ဆုံးရှုံးခြင်း(ဥ။ ။ 584) ကိုကြည့်ပါ။ မစင်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအရည်များ
များသောအားဖြင့်အူသိမ်သည်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်
အရည်သည်သာမန်ထက်ပိုကျယ်ပြန့်သည်။ ဤစုပ်ယူနိုင်သောအပိုအရည်
မစင်၌ထွက်သည်။

ဝမ်းလျှောရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁။ ဝမ်းလျှောခြင်း၏အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းအရင်းမှာအလွန်အကျွံသေးငယ်ခြင်း၊
အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားခြင်းသည်ဒေသခံယားယံခြင်းမှဖြစ်စေသည်
အူသိမ်တွင်ဘက်တီးရီးယား (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းကြောင့်အှန်ရံ
ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လား။ အူသိမ်၏လျင်မြန်သောကူးပြောင်းမှု
အကြောင်းအရာများသည်လုံလောက်သောစုပ်ယူမှုအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ကိုခွင့်မပြုပါ
အရည်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

၂။ ဓာတ်လွန်ကဲတက်ကြွသောအပိုင်းများပို့လှုံနေလျှင်ဝမ်းပျက်သည်။
lactase ချို့တဲ့မှုဥ်တွေရသော cles များသည်ငင်းတွင်ရှိသည်
အစာခြေလမ်းကြောင်း lumen ။ ဤအမှုန်များသည်အရည်များအလွန်အကျွံဖြစ်စေသည်
lumen ထဲသို့ ဝ ငရောက်၍ အရည်ကြည်ကိုတိုးစေသည်

၃။ *Vibrio cholera* (ဘက်တီးရီးယား) **မှ** အဆိပ်အတောက်များ
ကာလဝမ်းရောဂါ) နှင့်အခြားသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိအချို့သည်ရောဂါပိုးကိုပွားများစေသည်။
အူသိမ်မှအရည်များအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း
mucosa သည်ပြင်းထန်သောဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဝမ်းလျှောခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သည်
ကူးစက်ရောဂါများမှအဆိပ်များကိုတုံ့ပြန်မှုသည်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိကလေးငယ်ငယ်များသေဆုံးခြင်း ကံကောင်းထောက်မ။ ၊
တွန့်လိမ်စရိတ်သက်သာပြီးထိရောက်သော ခံတွင်းရေခါတ်ဖြည့်ဆေး သည်အားသာချက်ကိုယူသည်
အူ၏ကလူးကို့စ် symport သယ်ဆောင်သူသည်အသက်ကိုကယ်တင်သည်
သန်းပေါင်းများစွာသောကလေးများ (ခံတွင်းရေခါတ်ဖြည့်ခြင်းကုထုံးအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်
စ တွင်ပါရှိသော boxed feature ကိုကြည့်ပါ။ 634, ■ Concepts, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်
အငြင်းပွားမှုများ။)

အူမကြီး

အဆိုပါ **ကြီးမားတဲ့အူ** အူ, cecum, နောက်ချဆက်တဲ့ပါဝင်ပါသည်နှင့်
rectum (• ပုံ 16-28) ။ အဆိုပါ **cecum** ပုံစံများကိုတစ်ဦးမျက်စိကန်း-အဆုံးသတ်
အိတ်ငယ်များနှင့်အူမကြီးဆုံးရာအောက်တွင်ရှိသည်
ileocecal အဆို့ရှင်။ အောက်ခြေမှလက်ချောင်းနှင့်တူသောဆွဲအားငယ်
အဆိုပါ cecum အဆိုပါဖြစ်ပါတယ် **နောက်ချဆက်တဲ့,** အိမ်များတစ် lymphoid တစ်ရှူး lym-
phocytes (ဥ။ 418) ကိုကြည့်ပါ။ **အူမ** ကြီးသည် အများစုကိုဖြစ်စေသည်
အူမကြီးသည်သေးငယ်သောအူကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲစုံနေသည်

ဝမ်းလျှောခြင်းသည်အရည်နှင့် electrolytes ဆုံးရှုံးသည်။
စွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူသောအခါတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြိုင်မတိုက်ပါနှင့် အခြား acidJbase မူမမှန်မှုများဖြစ်ပေါ် နိုင်သည်။ ဤပုံမှန် neutralization ဖြစ်စဉ်များမဖြစ်နိုင်ပါ

သုံးအတော်နှင့်ရှည်ကြာသော *colon* ကို ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ ကူးလာရသည်ကိုအမှတ်ရစေသည်။ ပု *trans-* scending colon သည် S shape ဖြစ်လာပြီး *sigmoid colon* ကိုဖွဲ့စည်းသည် (*sigmoid* သည်“ S shape”) ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပြီးဖြောင့်တန်းသောပုံစံ ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ **rectum** (*rectum* ဆိုသည်မှာဖြောင့်ဖြောင့်ဟုဆိုလိုသည်) ။

စာမျက်နှာ ၁၃

ခံတွင်းရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကုထုံး: ရိုးရှင်းသောအဖြေကိုစုပ်ယူခြင်း အသက်တွေကိုကယ်တင်တယ်

ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေသောသေးငယ်သောပိုးမွှားများဖြစ်သော ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်စေသော *Vibrio* ကာလဝမ်းရောဂါ သည် ကလေးငယ်များတွင်သေဆုံးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာငါးယောက် ပြဿနာကအထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်သိသာထင်ရှားသည့် refu- ge ee စခန်းများနှင့်ဆင်းရဲသောနေရာများတွင် itary အခြေခံနေများသည်ပြန်ပွားမှုကိုအားပေးသည် သေးငယ်သောပိုးမွှားများနှင့်ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရှာပါးလာသည်။ Fortu- ယခုအချိန်တွင်ဈေးသက်သာသာဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သော၊ ရှုပ်ထွေးသောကုထုံး - ခံတွင်းရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်း ကုသမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်တီထွင်ခဲ့သည် သေစေနိုင်သောဝမ်းလျှောခြင်း။ ဤကုသမှုသည် luminal တွင်ရှိသောထောက်ခံသူများကို ploits villus epithelial ဆဲလ်များ၏နယ်နိမိတ်။

ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့ အသက်အန္တရာယ်ရှိသောဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါကိုကြည့်ပါ ရိုးရိုးပါးစပ်ရေဓါတ်ဖြည့်ခြင်းကုထုံးကသက်သာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အသက်တွေ။ အစာကိုအစာခြေနေစဉ် crypt သည် အူသိမ်၏ဆဲလ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားသည် succus entericus လို့ခေါ်တဲ့ဆားနဲ့ချဲ့ရည်၊ lumen ထဲသို့ ဤဆဲလ်များသည်တက်ကြွစွာကူး port Cl ₁ ကို lumen ထဲသို့ဖြွင့်တင်ပေးသည် Na ₊ နှင့် H ₂ O ကို အပြိုင် passive ပို့ဆောင်ခြင်း သွေးမှ lumen သို့ အရည်အချင်း ရေလိုအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် အစာအာဟာရကိုစုပ်ယူသောအင်ဇိုင်မ်ဓာတ်ပြိုကွဲမှုအတွက် စုပ်ယူနိုင်သောယူနစ်များထဲသို့ ဝ ငသည်။ ဂလူးကို့စ်နှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ စုပ်ယူနိုင်သောအစာများ ဘိုတိုက်ခရိတ်နှင့်ပရိတင်းအသီးသီး။ secondary active transport ကိုစုပ်ယူသည်။ ဤစုပ်ယူမှုယန္တရားသည်အသုံးပြုသည် Na ₊ Jglucose (သို့မဟုတ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး luminal mem- တွင်တည်ရှိသောသယ်ဆောင်သူ (SGLT) villus epithelial ဆဲလ်များ၏ brane (ကြည့်ပါ p ၇၃) ။ ၎င်းအပြင်သီးခြား active Na ₊ car- အာဟာရစုပ်ယူမှုနှင့်မဆက်စပ်ပါ Cl ₁ နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသော Na ₊ ကို လွှဲပြောင်းသည် l2 lumen မှသွေးထဲသို့ H ₂ O

ဤအမျိုးမျိုးသောလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်လျှို့ဝှက်ထားသောဆားကိုစုပ်ယူသည် H ₂ O သည်ကြေညက်သောအဟာရများနှင့်အတူ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆားနှင့် H ₂ O ကို စုပ်ယူသည်။ သူတို့ရဲလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတောင်းခံတယ်၊ ဒါတင်မကဘူး သို့လောင်ထားသောလျှို့ဝှက်ထားသောအရည်များထပ်မံတိုးချဲ့ gested salt နှင့် H ₂ O ကိုလည်းစုပ်ယူသည်။

ကာလဝမ်းရောဂါနှင့်ဝမ်းလျှောခြင်းများကိုဖြစ်စေသည် ရောဂါပိုးမွှားများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေသည် Cl ₁ ၏စွန့်ထုတ်မှု နှင့်/သို့မဟုတ်အက်ဖ်အေကိုထိခိုက်စေသည်။ Na ₊ ကို စုပ်ယူခြင်း (p ။ 85) ရလဒ်အနေနှင့်, သွေးမှအရည်များပိုထွက်လာသည် lumen ကိုနောက်ပိုင်းတွင်လွှဲပြောင်းသည် သွေးထဲသို့ပြန်ဝင်သည်၊ ပိုလျှံအရည်များဆုံးရှုံးသည် မစင်တွင်အရည်ကြိတ်ထားသောမစင်ကိုထုတ်ပေးသည် ဝမ်းလျှောခြင်း၏လက္ခဏာ ပိုအရေးကြီးတယ်၊ ပါလာသောအရည်များနှင့် electrolytes များဆုံးရှုံးသည် သွေးမှရေဓာတ်နှန်းခြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဟို ထိရောက်သောလည်ပတ်မှုကျဆင်းခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲ ပလာစမာပမာဏကိုစားသုံးခြင်းသည်သေစေနိုင်သည် ရက်၊ နာရီ (သို့) နာရီပေါ်မူတည်၍ အရည်ဆုံးရှုံးမှု၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်

လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ နန့်ကသမားတော်များသိလာသည် ဆုံးရှုံးသွားသောအရည်များနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုအစားထိုးခြင်း lytes များကိုသွေးကြောသွင်းခြင်းဖြင့်အများစု၏အသက်ကိုကယ်တင်ကာ ဝမ်းလျှောကောင်တွေ နေရာအတော်များများမှာ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးမှာလုံလောက်တဲ့အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့်ဝန်ထမ်းများမရနိုင်ပါ အကြောပြန်သွင်းခြင်းရေဓါတ်ဖြည့်ခြင်းကုထုံးကိုစီမံပါ။ ထိုကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာသောကလေးများသည်အောင်မြင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ခဲ့ကြသည်။ နှစ်စဉ်ဝမ်းလျှောသည်။

၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင်သုတေသီများက SGLT ကိုသင်ယူခဲ့သည် ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ crobes ။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦး တည်စေခဲ့တယ်။ **ခံတွင်းကိုရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ကုထုံး** အကြောင်း **ပြောပါ (ORT) ။** Na ₊ နှင့်ဂလူးကို့စ် နှစ်ခုလုံးဖြစ်သောအခါ lumen တွင်ရှိနေသော၊ ဤထောက်ခံသူကူးပြောင်းသည် ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးကို lumen မှအပေါက်သို့ပို့သည် villus epithelial ဆဲလ်များသည်၎င်းတို့မှ ဝ ငရောက်သည်

ORT ကိုအသက်ကယ်နိုင်ခြေကိုပထမဆုံးသက်သေ အတော်ကြာသောအခါ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ကွင်းပြင်၌ရောက်လာသည် အကြောဆေးသွင်းရန်ဆေးထိုးအပ်များ။ တစ်ခုထဲမှာ သို့သော်ဒုက္ခသည်စခန်းသည်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသိပ္ပံပညာရှင်များအုပ်စု ခံတွင်းရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုကိုစမ်းသပ်ခြင်း ဟုတ်သည်၊ မိသားစုများကို ORT စီမံရန်သင်ပေးသည် အများစုမှာဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါအတွက်ဖြစ်သည် ကလေးများ ရှားပါးသောအကြောဖြေဆေး မတတ်နိုင်သောသူများအတွက်မူပိုင်ခွင့်များထားရှိခဲ့ပါသည် သောက်။ ဝမ်းလျှောခြင်းကြောင့်သေဆုံးနှုန်းလျော့ကျခဲ့သည် ဒီစနှစ်းမှာ ၃% က ၁၀ ဆနဲ့နိုင်းယှဉ်တယ် အခြားဒုက္ခသည်များထက်သေဆုံးမှုပိုများ သည်။

ဤအထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည်စုစည်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ORT ကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်နေသည်။ အခြောက်ထုပ်များ ORT အတွက်ဆေးများကိုယခုအခါထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကမ္ဘာ ၃၀ ကျော်တွင်စုဆောင်းသည်။ ၆၀ ကျော်တွင်စုဆောင်းသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါခံစားနေရသောကလေးများအားကုသပေးပါသည် ထုပ်ပိုးထားသောအရောအနှော (သို့) အိမ်မှ ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ စီးပွားရေးအရပြင်ဆင်ထားသောပါးစပ်အဖြေများသည် ဆေးဆိုင်များ၊ ဈေးကွက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကလေး ၁ သန်း ထိုကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့နှစ်စဉ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသည် ORT ၏

အူမကြီးသည်အဓိကအားဖြင့်အခြောက်ခံသည် သို့လော်ငုံမှုအင်္ဂါ။

အူမကြီးသည်ပုံမှန်အားဖြင့် chyme ၅၀၀ မီလီလီတာခန့်ကိုလက်ခံရရှိသည် နေ့စဉ်အုပ်မိ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစာခြေဖျက်မှုနှင့်စုပ်ယူမှုအများဆုံးဖြစ်သည် အကြောင်းအရာတွေကိုအူသိမ်ထဲမှာပြည့်စုံပါပြီ အူမကြီးသို့ပို့ဆောင်သောအစာများသည်အစာမကြေနိုင်သောအစာအကြွင်းအကျန်များ cellulose အဖြစ်၊ စုပ်ယူမခံရသောသည်းခြေရည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကျန် အရည်သွင်းခြင်း အဆိုပါအူမကြီးကောက်နှတ်ချက်များထုတ်ယူပို့ပြီး H ကို ₂ သည် ရွှဲဂ်ဖျင်တဲ့ ဖယ်ထုတ်ရမည့်အရာကို **မစင်ဟုခေါ်သည်။** ဟို အူမကြီး၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်မစင်ကိုသိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည် ဝမ်းသွားခြင်း။ ၎င်းတွင်ပါ ဝ ငသော cellulose နှင့်အခြားအစာမကြေနိုင်သောအရာ

အစားအစာသည်အမြောက်အများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဝမ်းမှန်စေသည် colonic ပါဝင်မှုပမာဏကိုပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်

Haustral contractions သည်အူမကြီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမွေ့ပေးသည် အကြောင်းအရာများသည်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်

အူမကြီးသည်ပုံသဏ္ဌာန် longitudinal ချောမွေ့သောကြွက်သားအလွှာသည်လုံး ဝ မရှိပါ အူမကြီးကိုဝန်းရံပါ။ ၎င်းအစားထိုးတွင်သုံးမျိုးသာပါဝင်သည် ထူထဲသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ထင်ရှားသော၊ အလျားလိုက်တီးဝိုင်းများ။ **taeniae coli** သည်အူမကြီး၏အရှည်ကိုလည်ပတ်စေသည်။ ဒါတွေကတော့ taeniae coli ပါ အောက်ခြေရှိစက်ဝိုင်းပုံချောမွေ့သောကြွက်သားနှင့်ပိုတိုသည်။

စာမျက်နှာ ၁၄

စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအူမကြီး ဤကြီးမားသောသဘောတူညီချက် traction ကိုသင့်လျော်သော **mass move-** ဟုခေါ်သည်။
စကားများ၊ အူမကြီးအတွင်းပိုင်းများထဲသို့တွန်းပို့ပါ အူမကြီး၏အဝေးဆုံးအပိုင်း၊ မစင်စွန့်သည်အထိ terial ကိုသိုလှောင်ထားသည်။
အစားအစာသည်အစာအိမ်ထဲသို့ ဝ ငသောအခါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်သည် အူမကြီးအတွင်းလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် **gastrocolic reflex** အားဖြင့် **marily** ဖြစ်သည် အစာအိမ်မှအူမကြီးအထိညှိနှိုင်းပေးသည်



•ပုံ ၁၆-၂၈ အူမကြီး၏ခန္ဓာဗေဒ

ဤအကြောင်းကြောင့်အောက်ခံအလွှာများကိုအိတ်များထဲသို့ထည့်သည် haustra ဟုခေါ်သောအိတ်များ ၊ ၈ ကတ်အပြည့်ပါ ဝ ငိသောအရာများစုစည်းထားသည် ကျဉ်းသောခါးပတ်၌ haustra သည် passive သက်သက်မဟုတ်ပါ သို့သော်အမြဲတမ်းစုဝေး; သူတို့သည်တည့်နေရာတစ်ခုအားတက်ကြွစွာပြောင်းလဲခြင်း စက်ပိုင်းချောမွေ့ကြွက်သားအလွှာ၏ကျုံ့ခြင်း၏ရလဒ်

အချိန်အများစုတွင်အူမကြီး၏လှုပ်ရှားမှုများသည်နေးကွေးသည် ၎င်းသည်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်သိုလှောင်ရန်သင့်တော်သည့်အတိုင်း၊ အသက်အရွယ်လှပ်ဆောင်ချက် အူမကြီး၏အဓိကလှုပ်ရှား **နိုင်စွမ်း** မှာ **အလျင်စလိုဆန့်ကျင်ခြင်း** tions colon ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစည်းချက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုး ကြွက်သားဆဲလ်များကိုချောမွေ့စေသည်။ ထိုကျုံ့လိုက်သောအရာကြီးကိုပစ်လိုက် အူလမ်းကြောင်းသည် haustra သို့သေးငယ်သောအူလမ်းကြောင်းခွဲနှင့်တူသည်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားမှုနည်းသည်။ မိနစ်သုံးဆယ်ကြာနိုင် အလျားလိုက်ကျုံ့ခြင်း။ segmentation ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အူသိမ်၌အကျိတ်များသည် ၉ မှ ၁၂ ကြားနှုန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သည် တစ်ဝိနစ်လျင် ခရီးဆောင်အိတ်များ၏တည်နေရာသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ ကျောပိုးအိတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကန်ထရိုက်ပေးသောဖြေလျှော့မှုအပိုင်းအဖြစ် ယခင်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောနယ်မြေသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသက်သာသွားသည် sac အသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပါ။ ဤလှုပ်ရှားမှုများသည်အကြောင်းအရာများကိုဖြည် အစာအိမ်နာကိုဖော်ထုတ်သောအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ရောစပ်လှုပ်ရှားမှု စုပ်ယူနိုင်သော mucosa မှအကြောင်းအရာများ Haustral contractions တွေ့ရှိတယ် အများအားဖြင့်ပြည်တွင်းပါဝင်သောကြားခံတုံ့ပြန်မှုများဖြင့်ထိန်ချုပ်ထားသည်။ trinsic plexuses

အစုလိုက်အပြုံလိုက်လှုပ်ရှားမှုများသည်မစင်များကိုအဝေးသို့တွန်းပို့ဆောင်ကြောက်လာတယ်။

အများအားဖြင့်အစာစားပြီးပြီးချင်းတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်မှလေးကြိမ် လှုပ်ရှားမှုတွန်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအပိုင်းများအတွင်းတွင်ဖြစ်သည် ascending and transverse colon contract တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ မစင်ကိုအလျား၏သုံးပုံတစ်ပုံမှသုံးပုံတစ်ပုံအထိမောင်းနှင်သည်

မစင်များကိုဖယ်ထုတ်ပစ်သည့် defecation reflex အားဖြင့်

အစုလိုက်အပြုံလိုက်လှုပ်ရှားမှုများသောအခါအူမကြီးရွေ့သွားသည် မစင်သည်စအိုလမ်းကြောင်းထဲသို့ထွက်လာသည်။ စအိုလမ်းကြောင်းသည်ဆန့်ထွက်အားကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။

ဝမ်းသွားခြင်းကိုတွန်းလှန်ပြီးအစာအိမ်နံရံ၌တင်းသည် ။ ဒီပြန်လည် ပြန် သည် **အတွင်းပိုင်း anal sphincter** (ချောမွေ့ စေသော) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ကြွက်သား) ကိုဖြေလျှော့ရန်နှင့် rectum နှင့် sigmoid colon တို့ကျုံ့ရန် အားပေးသည်။ အဆိုပါ အကယ်. **ပြင်ပစအို sphincter** skel- ဖြစ်သော (etal ကြွက်သားများ) သည်လည်းဖြေလျော့။ မစင်စွန့်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ အရိုးစုဖြစ်ခြင်း ကြွက်သား၊ ပြင်ပ anal sphincter သည်ဆန္ဒအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ rectal နံရံ၏ကန ဦး တင်းအားသည်ဖိုက်ပါလာသည် ဝမ်းသွားခြင်း၊ ပြင်ပ anal sphincter ၏ဆန္ဒအလျောက်တင်းကျပ်ခြင်း ကိုတုံ့ပြန်မှုရှိနေသော်လည်းမစင်စွန့်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် နောင်နေ့နေသော rectal နံရံသည်တဖြည်းဖြည်းပြေလျော့လာပြီး၊ တစ်ဖန်မစင်သည်စအိုလမ်းကြောင်းထဲသို့တွန်းပို့သည် rectum နှင့် defecation reflex ကိုထွက်လာသည်။ ကာလများအတွင်း ရှားဘဲ၊ အစာအိမ်အကြောနှစ်ခုစလုံးသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်စာချုပ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ cal ဆက်လက်တည်ရှိမှု

မစင်စွန့်ခြင်းဖြစ်ပွားလျှင်ငင်အားအများအားဖြင့်အသံအားဖြင့်ကူညီသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများနှင့်ဆန့်ကျင်။ အဓမ္မသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း ဖိအားသည်မစင်ကိုနှင်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။

မစင်သောအခါဝမ်းချုပ်သည့် ဆိုးဆုံးအခြောက်လာတယ်။

မစင်စွန့်ခြင်းသည်အလွန်ကြာလျှင် **ဝမ်းချုပ်ခြင်း** ဖြစ်နိုင်သည်။ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားသောအခါ ပုံမှန်ထက် H ₂ O ကို ပုံမှန်ပမာဏထက်ပို စုပ်ယူသည် မစင်များမှငင်းသည်မာကျောပြီးခြောက်သွေ့လာသည်။ ပုံမှန်အပြောင်းအလဲများ

စာမျက်နှာ ၁၅

တစ် ဦး ချင်းစီအကြားမစင်စွန့်မှုနှုန်းသည်နောက်ပိုင်း မှစ၍ အစာစားပြီးတိုင်းတစ်ပတ်လျင်တစ်ကြိမ်အထိ အချိန်ဆွဲနေအုံးမှာပါ အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး အတွက်ပုံမှန်အရာထက် ကျော်လွန်၍ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤလက္ခဏာများပါဝင်သည် ဝမ်းဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း ပျို့အန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောအချိန်များ အဲကျွန်း လူသိများသောယုံကြည်ချက်ကိုလိုက်နာပါ။ ဤလက္ခဏာများသည်အဆိပ်ကြောင့် သို့လောင်ထားသော fecal မှစုပ်ယူသည်။ ဘက်တီးရီးယားဖြစ်သော်လည်း ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု (Metabolism) သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကို အူကြီး၊ ဒီအရာတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့် portal sys ကိုဖြတ်သွားတယ်။ tem သို့မရောက်မီအသည်းကဖယ်ရှားပစ်သည် စနစ်တကျလည်ပတ်မှု ၎င်းအစားလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သည် ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည်ကြီးကြီးမားမားကြာရှည်တည်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည် အူ၊ အထူးသဖြင့်စအိုလမ်းကြောင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများချက်ချင်းပျောက် တင်းကျပ်မှုမသက်သာပြီးနောက်ပေါ်လာသည်။

ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်နောင့်နေးသွားခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတွင် (၁) ဝမ်းသွားချင်စိတ်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ (၂) de- အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှု (သို့) နိမ့်ကျခြင်းတို့ပါ ဝ ငိသောအူမကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အမြောက်အများအစားအစာ; (၃) အူမကြီးတွင်မစင်လှုပ်ရှားမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် ပြည်တွင်းအကျိတ် (သို့) အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ (၄) ချို့ယွင်းချက် အာရုံကြောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကဲ့သို့မစင်စွန့်ခြင်းတုံ့ပြန်မှု ပါဝင်သောလမ်းကြောင်းများ

မာကျောသောမစင်ပါ ဝ ငိပစ္စည်းများသည်အက်ပ်တွင်ရှိနေလျှင် pendix သည်၎င်းသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့်ခွဲကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည် ဤကျဉ်းမြောင်း။ မျက်စိကွယ်သောအဆုံးအစွန်ခွဲလျှို့ဝှက်ချက် ဒီ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် **အူအတက်ကို** ဖြစ်ပေါ်စေသည် ။ အူအတက်ရောင်တတ်တယ် ရောင်ရမ်းလာပြီးပြည်ဖုံးနှင့်ပြည့်လာပြီးတစ်သျှူးများကဲ့သို့သေဆုံးနိုင်သည် ဒေသခံသွေးလည်ပတ်မှုအနှောင့်အယှက်၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွဲစိတ်မှုမလုပ်ရင် ရွှေ့သွားပြီးရောဂါ၏အူအတက်သည်ပေါက်ပြဿနာနိုင်ပြီးငင်း၏ရောဂါကူးစက်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်သည်။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း၌တင်းကျပ်သောအကြောင်းအရာများ

isms များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အန္တရာယ်မဖြစ်ရုံသာမကအမှန်တကယ်အကျိုးရှိသည်။ ဘို့ ဥပမာအားဖြင့်ဘာနေဘက်တီးရီးယား (၁) သည်အူလမ်းကြောင်းခုခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည် အာဟာရဓာတ်အတွက်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သောပိုးမွှားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည် အူမကြီး mucosal သမဓိ; (၄) အာဟာရပုံပိုးမွှေးများပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဘက်တီးရီးယားများသည်စုပ်ယူနိုင်သောဓာတုဗေဒ K ကိုပေါင်းစပ်ပြီးမြှင့်တင်ပေးသည် ပုံမှန်ထက် ကြောင့်ကယ်လစီယမ်စုပ်ယူမှုကိုအားပေးသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ဇင့် ဒါ့အပြင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အမျှင်ဓါတ်သည်အူမကြီး mucosa မှစုပ်ယူသည်။

အူမကြီးသည်ဆားနှင့်ရေကိုစုပ်ယူသည်၊ luminal အကြောင်းအရာများကိုမစင်အဖြစ်သို့ပြောင်းသည်။

စုပ်ယူမှုအချို့သည်အူမကြီးအတွင်းသို့ရောက်သည် အူသိမ်၌ကဲ့သို့အထိုင်းအတာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမြေးပါးသည် အူမကြီးမျက်နှာသည်အတော်လေးချောမွေ့သည်၊ ၎င်းသည်သိသိသာသာလျော့နည်းသည်။ ထိုပြင်၊ အူမကြီးဆွဲထားခြင်း၏ရလဒ်အားဖြင့် အူမကြီးသည်အထူးပြုသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုများသည် အသိမ်ဆည်ယန္တရားများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အလှူသေးငယ်သောအခါ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုသည်အစာမ ဝ င်မီအူမကြီးသို့အကြောင်းအရာများကိုပို့ဆောင်သည်။ အဘဟာရစုပ်ယူမှုပြီးစီးပြီ၊ အူမကြီးမနိုင်ပါ ဤပစ္စည်းများအများစုကိုစုပ် ယူ၍ ဝမ်းလျှောခြင်း၌ဆုံးရှုံးသည်။ အူမကြီးသည်ဆားကိုစုပ်ယူလေ့ရှိပြီး H ₂ O. Sodium သည် ac- ဓာင်ကျပ်စွာစုပ်ယူထားသော Cl ₂ သည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုအောက်သို့ငုံကြည့်သည်။ ent နှင့် H ₂ O သည်လုံး ဝ လည်ပတ်သည်။ အူမကြီးကတိုက်ဝင်ကိုစုပ်ယူသည် အခြား electrolytes များနှင့်ဗီတာမင် K တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည် colonic ဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆားနှင့် H ₂ O ကို စုပ်ယူခြင်းအားဖြင့် ခိုင်ခံ့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်သည် စွန့်ပစ်ခံရသည်။ ဓာတ်နေ့လျှင်အူမကြီးထဲသို့ ဝ ငိလာသော ၅၀၀ မီလီလီတာမှ အူသိမ်မှအူမကြီးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စုပ်ယူသည် ၃၅၀ မီလီလီတာ၊ မစင် ၁၅၀ ဂရမ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားပစ်သည်

အူမကြီးမှထွက်သော အရည်သည် ပုံမှန် ကာကွယ်ပေးသည်။
chyme မတိုင်မီအစာချေဖျက်မှုပြီးစီးသောကြောင့်မည်သူမျှမလိုအပ်ပါ
အူမကြီးသို့အမြဲရောက်သည်။ Colonic secretion သည် alkaline တစ်ခုပါဝင်သည်
(NaHCO ₃) ချဲရည်ကိုကာကွယ်ပေးသောသူ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဒဏ်ရာများမှကြီးမားသောအူလမ်းကြောင်း mucosa
ချဲသည်မစင်များကိုချောမွေ့စေရန်ချောဆီထုတ်ပေးသည်။
NaHCO ₃ မှထုတ်လုပ်သောယားယံစေသောအက်ဆစ်များကို ချေဖျက်ပေးသည်
ဒေသခံဘက်တီးရီးယားအချဉ်ဖောက်ခြင်း တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်တိုးလာသည်
colonic mucosa ၏စက်မှုနှင့်ဓာတုဗေဒနှိုးဆွမှု
တိုတောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့် parasympathetic အတွင်းစိတ်အားဖြင့်ညှိနှိုင်းသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အူမကြီးအတွင်း၌အစာခြေဖျက်မှုမရှိပါ
အစာခြေအင်ဇိုင်းများမရှိပါ။ သို့သော် colonic bacteria များရှိသည်
သူတို့၏အသုံးပြုရန် cellulose အချို့ကိုချေဖျက်ပါ။

အူမကြီးတွင်အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားများစွာရှိသည်။
နေ့ကွေးသောရွှေလျားမှကြောင့်ဘက်တီးရီးယားများကြီးထွားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်
နှင့်ကြီးမားသောအူထမ်အာစုပြီ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့အတွင်း
ပါဝင်သောအရာများအားလုံးစေသည်ဘက်တီးရီးယားအတွက်အလွန်လျင်မြန်စွာ
ကြီးထွားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ထို့ပြင်ပါးစပ်၊ အစာအိမ်နှင့်သေးငယ်သည်
အူလမ်းကြောင်းသည် antibacterial အေးဂျင့်များကိုစွန့်ထုတ်သော်လည်းအူမကြီးမှာ
မျိုချမိသောဘက်တီးရီးယားအားလုံးကို lysozyme နှင့် HCl တို့ကဖျက်ဆီးသည်။
ကျန်ရစ်သောဘက်တီးရီးယားများသည်အူမကြီး၌ဆက်လက်ရှင်သန်သည်။
လူအူမကြီးထက်ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ၁၀ ဆခန့်ပိုများသည်
လူခန္ဓာကိုယ်မှာဆဲလ်တွေရှိပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မျိုးစိတ် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိရှိသည်
ဘက်တီးရီးယားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အူမကြီး၌နေထိုင်သည်။ ဤအူမကြီး microorganisms

နေ့ရက်တိုင်း (၄၀ ဖြင့် ▲ ထားပဲတင် (၆-7)။ ဤမစင်ပစ္စည်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်
အစိတ်အပိုင်းအစများ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်သည်
cellulose, bilirubin, ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဆားနည်းငယ် ထို့ကြောင့်
လူကြိုက်များသောအယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်။ အစာခြေလမ်းကြောင်းသည်အဓိကမဟုတ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်မှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန် excretory passageway ဖြစ်သည်။ ဟိ
မစင်တွင်အဓိကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာဘိလီရူဘင်ဖြစ်သည်။ တခြားဟာတွေ
မစင်ပါဝင်မှုများသည်စုပ်ယူမထားသောအစာအကြွင်းအကျန်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများ၊
တကယ်တော့ဘယ်အရာကမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ဘက်တီးရီးယားအကောင့်
အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် H_2O ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်သည်
ခြောက်အလေးချိန်၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်

အူလမ်းကြောင်းဓာတ်ငွေ့များကိုစုပ်ယူသည့် (သို့) နှင်ထုတ်သည်။
ရံဖန်ရံခါမစင်အစားစအိုမှအူလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သွားသည်
ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ် **flatus** သည်ထွက်သည်။ ဤဓာတ်ငွေ့သည်အဓိကအားဖြင့်နှစ်ခုမှဆင်းသက်သည်
အရင်းအမြစ်များ - (၁) မျိုချလိုက်သောလေ (လေ ၅၀၀ မီလီလီတာအထိရှိနိုင်သည်
အစာစားနေစဉ်မျိုချချ (၂) ဘက်တီးရီးယားမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့ (၂) လုံး
အူမကြီး၌အချဉ်ပေါက်ခြင်း ဓာတ်ငွေ့များပျံ့နှံ့မှုရှိနေခြင်း
luminal အကြောင်းအရာများမှတဆင့်မြည်ဟည်းသောအသံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
အဖြစ်လူသိများ **borborygmi ။** Eructation (burping) သည်အများစုကိုဖယ်ရှားပေးသည်
အူ။ အများအားဖြင့်တော့သေးငယ်တဲ့နှာခေါင်းမှာဓာတ်ငွေ့အနည်းအကျဉ်းရှိနေတယ်။
ဓာတ်ငွေ့သည်လျင်မြန်စွာစုပ်ယူခြင်းသို့ ဝ ငရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
အူမကြီး။ အူမကြီးအတွင်းရှိဓာတ်ငွေ့အများစုသည်ဘက်တီးရီးယားများ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဓာတ်ငွေ့ပမာဏနှင့်သဘာဝ
အစာစားခြင်းနှင့်အူမကြီးဘက်တီးရီးယားများ၏လက္ခဏာများ

စာမျက်နှာ ၁၆

ဘက်တီးရီးယား။ ဓာတ်ငွေ့အများစုကိုအူမှတဆင့်စုပ်ယူသည်
mucosa ။ ကျန်တာတွေကိုစအိုကနေတဆင့်ထုတ်ပစ်တယ်။
မစင်တွင်ပါ ဝ ငသည့်ဓာတ်ငွေ့များကိုလည်းရွေးချယ်ထုတ်ပစ်ရန်
rectum သည်လူတစ် ဦး သည်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကိုအလိုလိုကျုံ့စေသည်
တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြင်ပ anal sphincter ဝမ်းဗိုက်သွားတဲ့အခါ
ကျုံ့ခြင်းကကန့်ထုဗိုက်ပေးထားတဲ့စအိုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖိအားကိုမြင့်တက်စေတယ်။
လုံလောက်သောဖိအား gradient သည်မြင့်သောအလျင်တွင်လေကိုထုတ်လွှတ်သည့်
အစိုင်အခဲအတွက်အလွန်ကျဉ်းသော slit ကဲ့သို့သောစအိုပေါက်မှတဆင့်ငင်း
ces မှတဆင့်လွှတ်မြောက်ရန်။ ဤရွေ့ကားသည်မြင့်မားသောအလျင်တွင်လေကိုဖြတ်သွားစေသည်
စအိုအဖွင့်အစွန်းများသည်တုန်ခါသွားပြီး charac- ကိုမြင့်တက်စေသည်။
ဓာတ်ငွေ့များပါ ဝ ငသောမြေပြင်မှအသံနိမ့်သံ

အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဟော်မုန်းများ

ဒီသုံးမျိုးရဲ့မတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုငါတို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီးပြီ
အဓိကအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဟော်မုန်းများ: gastrin, secretin နှင့် CCK
မင်းအခုချီးကျူးနိုင်အောင်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအတူတကွအံကိုက်ကြစို့။
ဤအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများအလိုက်လိုက်လျောညီထွေမှုအရေးကြီးပုံကိုစားခဲ့သည်။ ဥပမာ
thermorei ငါတို့သည်မကြာသေးမီကဖော်ထုတ်ခဲ့သောအစာအိမ်ရောဂါအကြောင်းအကြောင်းရင်းကိုဖြစ်သည်
ဝေးစေ့ဟော်မုန်း။ GIP ဤဟော်မုန်းအားလုံးသည် peptides လေးများဖြစ်သည်
G protein-coupled နဲ့ချိတ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါ
ငင်းသည်ငင်းတို့၏ပစ်မှတ်ဆဲလ်များ၏ plasma အမြေးပါးပေါတွင် receptors များ
ငင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဒုတိယ messenger လမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်စေသည်
လိုချင်သောတုံ့ပြန်မှုများ (စာမျက်နှာ ၁၁၇ ကိုကြည့်ပါ) ။

GASTRIN Protein သည်အစာအိမ်မှဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
trin သည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သော၊

၁။ ၎င်းသည် HCl ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတိုးစေရန်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်
pepsinogeni အစပြုရာတွင်အဓိကအရေးပါသောဓာတ်နစ်ခု
သူတို့၏အသားဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသောပရိတင်းဓာတ်ကိုအစာကြေစေသည်။

၂။ ၎င်းသည်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးတက်စေသည်၊ ileal motility ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
ileocecal sphincter သည်ငင်း၌အစုလိုက်အပြုံလိုက်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်
အူမကြီး - အကြောင်းအရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များ
ထမင်းစားချိန်ရောက်သောအခါဝေစာကို ဖြတ်၍ သွားနေသည်။

၃။ ၎င်းသည်အစာအိမ် mucosa ကိုသာမက trophic ဖြစ်သည်
သေးငယ်သောအူလမ်းကြောင်း mucosa ကိုကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရန်ထိန်းသိမ်းကူညီပေးခြင်း၊
အလုပ်မလုပ်နိုင်သောအစာခြေလမ်းကြောင်းအဖုံး။

ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အစာအိမ်မှအစာအိမ်အထွက်ကိုအစုအဝေးတစ်ခုကကန့်သတ်ထားသည်
အစာအိမ်၌အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနှင့် duodenal ၌ချိန်ခြေင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်
lumen ၏အက်ဆစ်နှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်နှောင့်နှေးရန်လိုအပ်သည်
အစာအိမ်စွန့်ထုတ်မှု

SECRETIN အစာအိမ်သည် duodenum ထဲသို့ရောက်သွားသည်နှင့်အမျှ
duodenum တွင်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုသည် se- ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
creptin သည်အောက်ပါဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်သည်

၁။ ၎င်းသည်အစာအိမ်မှအစာပို့ထွက်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသည်
အက်ဆစ်ရှိနေပြီးသည်အထိ duodenum ထဲသို့ ဝ ငသည်
neutralized ။

၄ ငင်းသည် NaHCO ₃ -bile သည်းခြေရည် ၏အသည်းမှထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် ။
ငင်းကိုကူညီရန် duodenum ထဲသို့စုပ်ယူသည်
neutralization လုပ်ငန်းစဉ်။ အက်စစ်ဓာတ် chyme ကို Neutralization လုပ်ခြင်း
duodenum သည် duodenal နံရံများပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်
အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်သင့်တော်သောပတ် ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်
အက်ဆစ်ဖြင့်တားထားသောပန်ကရိယအစာခြေအင်ဇိုင်းများ

၅။ Secretin နှင့် CCK တို့သည် exocrine အတွက် trophic ဖြစ်သည်
ပန်ကရိယ
ပန်ကရိယ

CCK chyme သည်အစာအိမ်မှအဆီနှင့်အခြားအာဟာရများ
ents များသည် duodenum ထဲသို့ ဝ ငသည်။ ဒီအာဟာရဓာတ်တွေ၊ အထူးသဖြင့်အဆီပိုတွေပါ
ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်များသည် CCK ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်၊
အောက်ပါဆက်စပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သော

၅။ ငင်းသည်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အထွက်အားကိုတားဆီးပေးသည်
duodenum တွင်ရှိနေသောအာဟာရဓာတ်များအတွက်လုံလောက်သောအချိန်
ချေဖျက်ပြီးစုပ်ယူသည်။

၂။ ငင်းသည်ပန်ကရိယ acinar ဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
ပန်ကရိယအင်ဇိုင်းများ၊ ငင်းတို့ကိုအစာချေဖျက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်
duodenum အဆီအာဟာရဓာတ် (၇)လုပ်ဆောင်ချက်သည်အထူးအရေးကြီးသည်
အဆီကိုချေဖျက်ပေးသည်။)

၃။ ငင်းသည်သည်းခြေအိတ်ကျုံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးအပန်းဖြေခြင်းကိုဖြစ်စေသည်
ileocecal sphincter သည်သည်းခြေရည်ကို duodenum ထဲသို့စုပ်ထုတ်သည်
အဆီချေဖျက်မှုနှင့်စုပ်ယူမှုကိုကူညီပေးသည်။ သည်းခြေး၏ဆပ်ပြာသည်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ပန်ကရိယ lipase ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အထူးအရေးကြီးသည်
ငင်း၏အစာခြေအလုပ် တစ်ဖန် CCK ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်

GASTRIN ရောက်ရှိနေသည့်အဆီနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သိသိသာသာကောင်းမွန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်
duodenum ၌ဤဟော်မုန်းကိုထုတ်လွှတ်သည်။

၄။ CCK သည်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲမှုများတွင်လည်းပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည်
တိုပြန်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်သောပန်ကရိယအင်ဇိုင်းအချိုးအစား
အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသောက်မှုအပြောင်းအလဲများအတွက်

၅။ ဖိုးရှိသောအကြောင်းရင်းများကြောင့် CCK
အစာ၊ အစာစားသုံးမှု၏အရေးပါသောထိန်းညှိသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်
အူမကြီးများချင်စိတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု (p ။ 647 ကိုကြည့်ပါ) ။

GIP A သည်မကြာသေးမီကထုတ်လွှတ်သောအသိအမှတ်ပြုထားသောဟော်မုန်းဖြစ်သည်။
denum, **GIP** သည် nutri- ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။
ents များကိုစုပ်ယူသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဤဟော်မုန်းသည်မူလကဖြစ်သည်
အမည်ရှိ အစာအိမ် *inhibitory peptide* (*GIP* အဖြစ်ကငင်း၏ယူဆအခန်းကဏ္ဍများအတွက်)
ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ငင်းသည်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုဟန့်တားသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်
secretin နှင့် CCK တို့နှင့်ဆင်တူသည်။ GIP ၏ပံ့ပိုးကူညီမှု
ဤကိစ္စအားယခုအနည်းငယ်မျှသာစဉ်းစားသည်။ အဲဒီအစား၊ ဒီဟော်မုန်း
ပန်ကရိယမှအင်ဆူလင်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ငင်းကိုယခုခေါ်သည်
glucose-dependent insulinotrophic peptide (တစ်ဖန်၊
GIP) တဖန်ငင်းသည်သိသိသာသာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည်။ ထမင်းစားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်
စုပ်ယူသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည်ငင်း၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဂိုယာများကိုသုံးရန်နှင့်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်
အသစ်ရောက်ရှိလာသောအာဟာရများကိုသိုလှောင်ပါ။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများ
ဤစုပ်ယူမှုအဆင့်သည့်အင်ဆူလင်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်
(စစ။ ၇၁၃ နှင့် ၇၁၇ ကိုကြည့်ပါ) ။ ထမင်းတစ်နပ်ရှိနေခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊
အထူးသဖြင့်ဂလူးကို၏၊ အစာခြေလမ်းကြောင်း၌ GIP သည်ပြန်လည်စတင်သည်။
အစာစုပ်ယူမှုကိုမျှော်မှန်းရန်အင်ဆူလင်ဌားရမ်းခြင်း၊

ဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် ဆီးချိုရောဂါ၏ ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ ထိုအခန်းကဏ္ဍများကို ဆောင်ရွက်ရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရွာသူကြီးများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ကျေးရွာလူကြီးများ၊ ရပ်ကွက်ခေါင်းဆောင်များ၊ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်ဒေသခံ ပြည်သူများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသ

၉။ ဗိုက္ကာရိုမြားကို့ဖြစ်စေသည်
10. alkaline ဖြစ်သည်
၁၁။ အန္တရာယ်ရှိသောသွေးအားနည်းရောဂါခံ့ချိုတဲ့သည်
12. အစာအိမ် mucosa ကိုဖုံးအုပ်သည်

စာစီစာကုံးမေးခွန်းများ

၁။ အခြေခံအစာခြေဖြစ်စဉ်လေးခုကိုဖော်ပြပါ။

၂။ စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသောအစားအစာသုံးမျိုးနှင့်အမျိုးအစားများကိုစာရင်းပြုစုပါ
တစ်ခုစီ၏စုပ်ယူနိုင်သောယူနစ်များ

၃။ အစာခြေစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ကိုဖော်ပြပါ
အစာခြေလမ်းကြောင်း၏အပိုင်းခွဲခန္ဓာဗေဒ

၄။ မြေကြီးအားထိန်းညှိရာတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်အချက်လေးချက်ပါ ဝ ငသည်။
tive system ရဲလုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ။ တစ် ဦး စီရဲအခန်းကဏ္ဍဘာလဲ။

၅။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၌လှုပ်ရှားနိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြပါ
အစာခြေလမ်းကြောင်း။ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီကိုမည်သည့်အချက်များကထိန်းချုပ်သနည်း။

၆။ လျှို့ဝှက်ထားသောအစာခြေရည်၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖော်ပြပါ
အစာခြေစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ ကိုဖော်ပြပါ
အစာခြေဖျက်မှုတစ်ခုစီကိုထိန်းချုပ်သောအချက်များ

၇။ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုချေဖျက်ရာမှာပါဝင်တဲ့အင်ဇိုင်းတွေကိုစာရင်းပြုစုပါ
အစားအစာ လျှို့ဝှက်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုညွှန်ပြပါ
အင်ဇိုင်းတစ်ခုစီ

အူလမ်းကြောင်းဟော်မုန်း CIP ရဲအခန်းကဏ္ဍဘာလဲ။
၁၃။ မည်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုမစင်မှစွန့်ထုတ်သနည်း။
၁၄။ အန်ခြင်းသည်မည်သို့ပြီးမြောက်သနည်း။ အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲ
အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များ
၁၅။ အစာအိမ်၌ mucosal လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြပါ
နှင့်အူသိမ်။

Quantitative လေ့ကျင့်ခန်းများ (p ။ A-53 တွင်ဖြေရှင်းနည်းများ)

၁။ အူ၌ lipid အစက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့
အချင်း ၁ စင်တီမီတာနှင့်
a ချလိုက်တဲ့မျက်နှာပြင်အကျယ်အ ဝ နှံးနဲ့အကျယ်အ ဝ နှံးကဘယ်လောက်လဲ။
ထား? (အရိပ်အမြွက်: တစ်နယ်ပယ်များ၏ဧရိယာ4π။ဖြစ်ပါတယ် ։ , နှင့် volume သည် ၄/၃π ့)
ခ ယခုဤအစက်ထဲသို့ emulsified လုပ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့
မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တန်းတူသေးငယ်တဲ့အစက် ၁၀၀ အာကာသကဘာလဲ
ရေစက်တစ်ခုစီ၏အသက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာ – မှ – ထူထည်အချိုး?
ဂ ဒီမျက်နှာပြင်တွေရဲစုစုပေါင်းဧရိယာကဘယ်လောက်ပိုကြီးလဲ
မူလတစ်ခုတည်းသောရေစက် (၁၀၀) ထက်ပိုသေးငယ်သလား။
ဒါလည်း ရလဒ်အနေဖြင့်စုစုပေါင်းပမာဏမည်မျှပြောင်းလဲခဲ့သနည်း
emulsification ဆိုတာဘာလဲ။

အမှတ်များ

(စာမျက်နှာ -၅၃ တွင်ရှင်းလင်းချက်များ)

၁။ အစာအိမ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောလှုနာများသည်အဘယ်ကြောင့်
အစာအိမ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောကုသမှုများအတွက် achs ကိုဖယ်ရှားသည်
peptic ulcer ရောဂါအတွက်အစာအနည်းငယ်သာစားရုပါမည်
တစ်နေ့သုံးနပ်အစားမစားဘဲနေလေ့ရှိသလား။

၂။ အူနှင့်ဆက်စပ်သော *lym*- ကိုယ်ခံအားဆဲလ်အရေအတွက်
phoid တစ်ရှူး *(GALT)* သည် mucosa ၌ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းသည်
ငင်၌ဤကာကွယ်ရေးဆဲလ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်နှင့်ညီမျှသည်
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်။ လိုက်လျောညီထွေမှု၏အရေးပါမှုကိုချင့်ချိန်ပါ
ဤအစာခြေစနစ်၏ကျယ်ပြန့်သောကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်

၃။ လူနာဆီးသွားရာတွင်ဆီးသွားခြင်းကိုမည်သို့ပြီးမြောက်စေမည်နည်း။
ခါးအောက်ပိုင်းမှကျောရိုးဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်ခါးမှဆွဲထုတ်ခံရသလား။

၄။ bilirubin ကိုအသည်းမှသွေးမှထုတ်ယူပြီးနောက်ငင်းသည်
ပေါင်းစည်းထားသော (ပေါင်းစပ်) glucuronic acid နှင့် ပေါင်း၍၊
အသည်းအတွင်းမှ zyme glucuronyl transferase အခါသာ
ပေါင်းစည်းထားသော bilirubin ကိုသည်းခြေရည်ထဲသို့တက်ကြွစွာစွန့်ထုတ်နိုင်သည်။
ဘ ဝ ရဲ့ပထမဆုံးရက်အနည်းငယ်မှာအသည်းကကောင်းကောင်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။
glucuronyl transferase ၏ပမာဏကိုဖြတ်ပါ။ ဘယ်လိုရှင်းပြလဲ
ဤယာယီအင်ဇိုင်းချို့တဲ့မှုသည်အဖြစ်များစေသည်
မွေးကင်းစကလေးငယ်များတွင်အသားဝါရောဂါအခြေအနေ

၅။ အစာအိမ် (သို့) အစာအိမ်ကိုဘာကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရလဲဆိုတာရှင်းပြပါ။
nal ileum သည်အန္တရာယ်ရှိသောသွေးအားနည်းရောဂါကိုဖြစ်စေသည်။

(စာမျက်နှာ -၅၃ တွင်ရှင်းပြချက်)

သောမတ်စ်ဒဇလျူသည်သူ၏ညာဘက်အပေါ် ပိုင်းခွဲပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကိုခံစားသည်။
အမျိုးသားများသည်အဆီများသောအစာကိုစားပြီးနောက် ထို့အတူသူ့အားလည်းသတိပြုမိသည်

မစင်သည်အညိုရောင်အစားအဖြူရောင်ရှိသည်။ အများဆုံးကဘာလဲ
သူ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိလား။ ဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းပြပါ။
toms သည်ဤအခြေအနေနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သည်။

စာမျက်နှာ ၁၉

စွမ်းအင်အတွက်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများ
Balance နှင့် Temperature Regulation

Hypothalamus

အစားအစာ
စားသုံးမှု

ခန္ဓာကိုယ်စနစ်များ
homeostasis ကိုထိန်းသိမ်းပါ

ချွေးထွက်ခြင်း
ဂလင်း

Homeostasis ဖြစ်သည်
homeostatically ဖြစ်ကြောင်းအချက်များအနက်
ထိန်းသိမ်းမှုများသည်စွမ်းအင်ကြွယ်ဝမှုရရှိမှုဖြစ်သည်
ဆဲလ်များနှင့်အပူချိန်အတွက်အာဟာရဓာတ်များ
ပြည့်တင်းပတ်ဝန်းကျင်။ hypothalamus သည်
အခြေခံဖြစ်သောအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိပေးသည်
စွမ်းအင်ဟန်ချက်ခွဲအရေးပါပုံ။ hypothalamus သည်
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလည်းထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်
အရိုးကြွက်သားများမှအပူထုတ်လုပ်မှုကွဲပြားသည်
အရေပြားမျက်နှာပြင်မှအပူဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်
သွေးပူနေသောပမာဏကွဲပြားသည်
အရေပြားတန်ဆာများမှတဆင့်စီးဆင်းသည်
ချွေးထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။

အရေပြားတန်ဆာများ

Homeostasis ဖြစ်သည်
အတွက်မရှိမဖြစ်
ဆဲလ်များ၏ရှင်သန်မှု

အရိုးအကြောများ

ဆဲလ်များ
ဆဲလ်တစ်ခုစီသည်လုပ်ဆောင်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်
ကိုယ်ပိုင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
ရှင်သန်မှုနှင့်၎င်း၏အထူးပြုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပုံပိုးကူညီမှု
homeostasis ။ ဆဲလ်များမှအသုံးပြုသောစွမ်းအင်အားလုံးသည်
နောက်ဆုံးတွင်အစားအစာစားသုံးမှုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်
စွမ်းအင်ဟန်ချက်ထိန်းရန်ထိန်းညှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်
အပူချိန်တစ်ခုတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်
ကာကွယ်ရန်အတော်အတန်တည်ငြိမ်သောအဆင့်ဖြစ်သည်
နှုန်းကိုမလိုလားအပ်သောအပြောင်းအလဲများ
ဆဲလ်များအတွင်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ
ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်
ဆဲလ်ပရိုတင်းများသို့
အပူမှ

ဆဲလ်များဖွဲ့စည်းသည့် ခန္ဓာကိုယ်စနစ်များ

ပါဝါဆဲလ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူလွန်ကဲလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးစေသော anisms
ကိုယ်အလေးချိန်အမြဲရှိနေရန်အစားအစာ၏ကယ်လိုရီတန်ဖိုးရှိရမည် အရိုးအကြောကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှု (သို့) ပူပြင်းသောပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှ
စုစုပေါင်းစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ညီမျှသည်။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ် **ဟန်ချက်ကိုထိန်းညှိပေးသည်**nment ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးရမည်
အစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအဓိကထိန်းသည်။ ဆဲလ်များ၏ဓာတုတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်
စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်သည်အပူကိုထုတ်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဆဲလ်ပရိုတင်းများကိုပျက်စီးစေသည်။
အပူချိန်ထိန်းညှိ။ များသောအားဖြင့်လူသားတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာ hypothalamus သည်အဓိကပေါင်းစည်းရေးစင်တာဖြစ်သည်
သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုအေးသောကြောင့်အပူကိုအဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးရမည် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းသိမ်းပါ။
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းပါ။ ဒါ့အပြင်သူတို့မှာ Mech ရှိရမယ်၊

စာမျက်နှာ ၂၀

စွမ်းအင် Balance နှင့် အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း

အခန်း ၁၇

အကြောင်းအရာများအားအချက်ပြပါ

စွမ်းအင် Balance
စွမ်းအင်သွင်းအားစုနှင့်အထွက်အရင်းအမြစ်များ
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း
ကြားနေ၊ အပေါင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်မျှခြေ
စွမ်းအင်ဟန်ချက်ထိန်းခြင်းနှင့်အစားအစာထိန်းချုပ်ခြင်း
စားသုံးမှု

အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်
အပူရရှိမှုနှင့်အပူဆုံးရှုံးမှုအရင်းအမြစ်များ
အပူလဲလှယ်မှု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများ
hypothalamus ကို thermostat အဖြစ်သုံးသည်
အပူထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်ရေး; တုန်လှုပ်နေသည်
အပူဆုံးရှုံးမှုထိန်းချုပ်ရေး; အရေပြား vasomotor လှုပ်ရှားမှု
အအေးနှင့်အပူထိတွေ့မှုပေါင်းစပ်မှုတုံ့ပြန်မှု
ဖျားခြင်း။ ကိုယ်ပူခြင်း

စွမ်းအင် Balance

ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်တစ်ခုစီသည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများလုပ်ဆောင်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်
ဆဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုအတွက် (တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်
ဆယ်လူလာပြုပြင်ခြင်း) နှင့်၎င်း၏အထူးပုံပိုးမှုများဆောင်ရွက်ရန်
homeostasis (ဂလင်းထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်၊
ကြွက်သားကျုံ့ခြင်း) ။ဆဲလ်များမှအသုံးပြုသောစွမ်းအင်အားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်ထောက်ခံသည်။
အစားအစာစားသုံးမှုအားဖြင့်ဆန့်ကျင်သည်။

အစားအစာအများစုသည်နောက်ဆုံးတွင်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူထဲသို့

thermodynamics ၏ **ပထမဥပဒေအရ** စွမ်းအင်သည်ဖြစ်နိုင်သည်
မဖန်တီးဘူး၊ မဖျက်ဆီးဘူး။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအင်သည်မူတည်သည်
ဓာတုဗေဒပေါင်းစပ်မှုကဲ့သို့အထွက်၊ အထွက်ညီမျှမှု
H_2O နှင့်ဆား ကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားများ (p ။ 557 ကိုကြည့်ပါ) ။

စွမ်းအင်ထည့်သွင်းခြင်း **နှင့်ထုတ်ခြင်း** စွမ်းအင်ကိုစားသုံးမိသောအစားအစာများမှစွမ်းအင်
stitutes စွမ်းအင် *input* ကို ယျခန်ဓာရန်။ ဓာတုစွမ်းအင်များသည်သော့ခတ်ထားသည်
အာဟာရဓာတ်မော်လီကျူးများတွင်အက်တမ်များကိုတွဲထားသည့်နှောင်ကြိုးများသည်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဂျိမော်လီကျူးများသည်ခန္ဓာကိုယ်၌ပြိုကွဲသောအခါ၎င်းရမ်းသည်။ ဆဲလ်များ
မြင့်မားသောစွမ်းအင်၌ဤအာဟာရဓာတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖမ်းယူပါ
ATP ၏ဖော့စဖိတ်ဌေးချေးစာချုပ်များ (စစ။ ၃၂ နှင့် A-၁၇ ကိုကြည့်ပါ) ။ စွမ်းအင်
မျိုချမိသောအာဟာရများကိုဇီဝဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ရယူခြင်းသည် ei-
၎င်းကိုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်ချက်ခြင်းသုံးသည်
အစာစားနေစဉ်ကာလအတွင်းလိုအပ်သောခန္ဓာကိုယ်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်သုံးရန်
အစာမကြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းမရှိပါ။

ခန္ဓာကိုယ်မှ စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု (သို့) အသုံးစရိတ် သည်ကြောင်နှစ်ကောင်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
egories (• ပုံ 17-1): ပြင်ပအလုပ်နှင့်ပြည်တွင်းအလုပ်။ **Ex-**
ternal အလုပ်လုပ် ခြင်းသည်အရိုးကြွက်သားများရှိသောအခါသုံးသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်
ပြင်ပမှအရာဝတ္ထုများကိုရွှေ့ရန် (သို့) ခန္ဓာကိုယ်အား rela-
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားသည်။ **ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး** သည်အခြားအရာအားလုံးနှင့်ဖွဲ့စည်းသည်
မပြီးမြောက်နိုင်သောဇီဝစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ပုံစံများ
ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်သည်။ အတွင်းပိုင်းအလုပ်များပါဝင်သည်
စွမ်းအင်ကိုမြို့ခိုသောလုပ်ဆောင်မှုနှစ်မျိုး (၁) အရိုးကြွက်သား
လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့သောပြင်ပအလုပ်များထက်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်
ကိုယ်ဟန်အနေအထားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောကျုံ့ခြင်း
ing; (၂) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလုပ်ငန်းများအားလုံး
ဘဝရပ်တည်ဖို့အချိန်တိုင်းပဲ။ အဆုံးစွန်သောအမှုတို့ပါဝင်သည်
သွေးစုပ်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်း၊ တက်ကြွမှုအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်

http: // www တွင် CengageNOW သို့ဝင်ရောက်ပါ
ကာတွန်းများ ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းအတွက် .cengage.com/ sso/
သင်လေ့လာ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ရန်ကူညီပေးမည့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ပေးဒီဗျူးများ
ဇီဝကမ္မဗေဒသဘောတရားများ။

ပုလာဘူစမှာအမြေးဂျိုးတစ်လျောက်အရေးမျိုးစုဘုပ္စည်းများသည်ပုပ်ဆွေးခြင်းနှင့်
ငင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်တုံ့ပြန်မှုများအတွင်းအသုံးပြုသောစွမ်းအင်၊
ဆဲလ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆဲလ်တည်ဆောက်မှုကြီးထွားခြင်းတို့ပါဝင်သည်
တိုတိုတုတ်တုတ်၊ “ လူနေမှုဘ ဝ ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်”

စာမျက်နှာ ၂၁

စွမ်းအင်ထည့်သွင်းခြင်း

အစားအစာစွမ်းအင်

ဇီဝဖြစ်စဉ်
ခန္ဓာကိုယ်၌ရေကန်

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသည်

အတွင်းပိုင်းအလုပ်

ပြင်ပအလုပ်

အပူစွမ်းအင်
(အပူ)

အပူထုတ်လုပ်မှုနှုန်း
တစ်နာရီကီလိုကယ်လိုရီ အခြေခံဖြစ်သည်
အပူစွမ်းအင်ယူနစ်သည် **ကယ်လိုရီ၊**
ငင်းသည်အပူပြုန်ပမာဏ
အပူချိန်ကိုမြှင့်တင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်
၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြင့် H_2O ၁ ဂရမ် ဒီယူနစ်လည်းပါတယ်
သေးငယ်တဲ့အခါအဆင်ပြေဖို့
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်
ပါဝင်သောအပူပြင်းအား၏
ဒါကြောင့် **ကီလို ကယ်လိုရီ** (သို့) **ကယ်လိုရီ**
ငင်းသည် ၁၀၀၀ ကယ်လိုရီနှင့်ညီမျှသည်။
ries ကိုသုံးသည်။ အာဟာရပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အခါ
တွက်ချက်ရာတွင်“ ကယ်လိုရီ” အကြောင်းပြောပါ
အမျိုးမျိုးသောစွမ်းအင်ပါဝင်မှု
အစားအစာများ၊ ငင်းတို့ကိုအမှန်တကယ်ရည်ညွှန်းသည်
ကီလိုကယ်လိုရီ (သို့) ကယ်လိုရီသို့ လေး
အပူစွမ်းအင်ကိုလိုကယ်လိုရီကိုပြန်လည်
ဂရမ်းကိုစ် ၁ ဂရမ်အောက်စီဂျင်ရသောအခါငှားရမ်းခြင်း

•ပုံ ၁၇-၁ **စွမ်းအင်အ ဝ င်နှင့်အထွက်** (ဓာတ်ပုံများ၊ ဘယ်ဘက်၊ Ralph Pleasant/FPG/Getty ပုံများ၊
ဗဟို၊ Ed Reschke; မှန်ပါတယ် Gary Head)

အပူဓာတ်ကိုရရှိစေသောအာဟာရဓာတ်ကိုရယူခြင်း စွမ်းအင်အားလုံးမဟုတ်ပါ
အာဟာရဓာတ်မော်လီကျူးများကိုဇီဝဗေဒအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်
အလုပ်။ စွမ်းအင်ကိုမဖန်တီးနိုင်၊ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ၊ သို့သော်ငင်းကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ပုံစံတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းသွားသည်။ အာဟာရမဲ့တွင်ရှိသောစွမ်းအင်
စွမ်းအင်ကိုအသုံးမပြုသော cules များသည် **အပူ** အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်
စွမ်းအင် (သို့) **အပူ** ဇီဝဓာတုဗေဒလုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်းအကြောင်းများသာရှိသည်
အာဟာရမော်လီကျူးများမှစွမ်းအင် ၅၀% ကို ATP သို့လွဲပြောင်းသည်။
အခြားအာဟာရစွမ်းအင် ၅၀% သည်အပူကြောင့်ချက်ချင်းဆုံးရှုံးသည်။
ဆဲလ်များဖြင့် ATP အသုံးစရိတ်ကာလအတွင်းနောက်ထပ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
စားသုံးမိသောအစာမှရရှိသောအပူသည်အပူဖြစ်လာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
ခန္ဓာကိုယ်သည်အပူအင်ဂျင်မဟုတ်ပါ၊ ငင်းသည်အပူသို့အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်အာဟာရစွမ်းအင်၏ ၂၅% ထက်မပိုရ
ပြင်ပဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သည်။ ကျန် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆုံးရှုံးသည်
အာဟာရမှစွမ်းအင်များဆက်တိုက်လွှဲပြောင်းနေစဉ်အပူ
ATP မှမော်လီကျူးများသည်ဆဲလ်စနစ်များသို့
ထို့ပြင်အသုံးပြုရန်ဖမ်းယူသောစွမ်းအင်များ၏
ခန္ဓာကိုယ်မှသုံးစွဲသောစွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်လာသည်
အပူ။ သာဓကအနေနှင့်နလုံးမှစုပ်ထုတ်သောစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်
သွေးစီးဆင်းမှုများပွတ်တိုက်မှုကြောင့်သွေးသည်တဖြည်းဖြည်းအပူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်
သဘော်များမှတဆင့် ထိုနည်းတူစွာပေါင်းစပ်မှုသုံးသောစွမ်းအင်
တည်ဆောက်ပုံပရိတ်နီးသည်နောက်ဆုံးတွင်အပူအဖြစ်ပေါ်လာသည်။
tein သည်ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပျက်စီးသွားသည်
ကိုယ်ခန္ဓာမဆန္ဒနယ်များ။ ပြင်ပအလုပ်များလုပ်ဆောင်ရာတွင်တောင်မှ skele-
tal ကြွက်သားများသည်ဓာတုစွမ်းအင်ကိုစက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းသည်
ထိထိရောက်ရောက်; သုံးစွဲသောစွမ်းအင်၏ ၇၅% လောက်ဆုံးရှုံးသည်
အပူ။ ထို့ကြောင့်မစားသောအစာများမှစွမ်းအင်အားလုံးလွတ်မြောက်သည်
အရာ ဝ ထွာများကိုရွေ့လျားရန်သို့မဟုတ်အဆီတွင်သိုလှောင်ရန်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ
pose တစ်သျှူးများ) သိုက်များ (သို့မဟုတ်ကြီးထွားမှုတွင်ပရိုတင်းကဲ့သို့)။
နောက်ဆုံးတွင်ခန္ဓာကိုယ်အပူများလာသည်။ ဤအပူသည်လုံးဝအလဟဿမဖြစ်ပါ
သို့သော်စွမ်းအင်အများစုသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်
အပူခိုန်။

ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှုန်းဖြစ်သည်။

နစ်ခုလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ကစွမ်းအင်သုံးစွဲတဲ့နှုန်း
ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းကို **ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း** ဟုခေါ်သည် ။

ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်/အချိန်ယူနစ်

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အများစုဟာနောက်ဆုံးမှာ
သစ်တော်သီးသည်အပူကဲ့သို့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုပံ့မှန်အားဖြင့်ဖော်ပြသည်

ဓာတ်စာ။ ဤခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် **ညီမျှသောစွမ်းအင်ကို** ခေါ်သည်
အို ₂ , စွမ်းအင် 4.8 kilocalories အိုလီတာနှုန်းလွတ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ် ₂ con-
ခြင်ငှဲ့ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လူတစ် ဦး ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း
O_2 ကို ၁၅ လီတာ/နာရီနှုန်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းခန့်မှန်းနိုင်သည်။

၁၅ လီတာ/နာရီ O_2 စားသုံးမှု
၄.၈ ကီလိုကယ်လိုရီ/လီတာစွမ်းအင်သည် O_2 နှင့်ညီမျှသည်
၇၂ ကီလိုကယ်လိုရီ ခန့်မှန်းခြေဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း

ဤနည်းဖြင့် O_2 စားသုံးမှုကို ရိုးရှင်းစွာတိုင်းတာ နိုင်သည်
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသုံးသည်။

▲ TABLE 17-1

စွမ်းအင်နှုန်း
ကီလို ၇၀ အတွက်အသုံးစရိတ်
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီတဲ့ကာလမှာ
လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားများ

လှုပ်ရှားမှုပုံစံ	စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် (kcal/နာရီ)

စာမျက်နှာ ၂၂

အခြေခံသတ္ထုနှုန်းကိုတိုင်းတာရန်အခြေအနေများ
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းနှင့်ရလဒ်အနေဖြင့်အပူပမာဏ
duced သည်အချက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်၊ ဥပမာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊
စိုးရိမ်စိတ်၊ တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်အစာစားသုံးမှု၊ အရိုးကြွက်သားများတိုးလာသည်
လုပ်ဆောင်ချက်သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုမြင့်မားစေသောအချက်ဖြစ်သည်။
အတိုင်းအတာ။ ကြွက်သားလေသံအနည်းငယ်သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းနှင့်ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုအဆင့်အမျိုးမျိုး
စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေရန် ▲ ဇယား
၁၇-၁) ။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူတစ် ဦး ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်သည်
standardized basal အခြေအနေများအရထိန်းချုပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောကိန်းရှင်များကိုတတ်နိုင်သမျှများစွာ ၌
ဤနည်းအားဖြင့်အခြေခံကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ရှားမှု
အနားယူခြိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ **Basal** လို့ခေါ်တာ
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်း (BMR) သည်ခန္ဓာကိုယ်၏“ မလှုပ်မယှက်သောအမြန်နှုန်း” ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
သို့မဟုတ်အတွင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏အနည်းဆုံးနှုန်း။ ဟိ
BMR ကိုအောက်ပါသတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်တိုင်းတာသည်။

၁။ လူသည်ရှောင်ကြဉ်။ ကာယအားဖြင့်အနားယူသင့်သည်
မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
ကြွက်သားများကိုအပူထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်။

၂။ လူတစ် ဦး သည်အရိုးစုကိုလျော့ချရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာယူသင့်သည်
ကြွက်သားသံများ (လူတို့သည်စိတ် ဝ ငိလာသောအခါ) ပိုတင်းလာသည်
တွန့်ဆုတ်မှုသောဟော်မုန်းဖြစ်သော epinephrine မြင့်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါ
စိတ်စိစဉ်းစားမှုအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုတိုးစေသည်။

3. တိုင်းတာခြင်းကိုအဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အချိန်ကြောင့်လူသည်မတုန်လှုပ်ပါ။ တုန်လှုပ်မိုင်သည်
အပူထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။

၄။ ဘာသာရပ်သည် ၁၂ နာရီအတွင်းမည်သည့်အစာကိုမှမစားသင့်ပါ
BMR ဆုံးဖြတ်ခြင်းမတိုင်မီ **အစားအစာမှအပူပေးသောအပူ** ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
genesis (*thermo* ဆိုသည်မှာ“ အပူ”)၊ ၃ ပါဒ် ” ထုတ်လုပ်မှု”)၊ သို့မဟုတ်
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့်ဖြစ်ပေါ်သောဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမြင့်တက်မှု
အစားအစာစားသုံးမှုပမာဏ ဤခဏတာ (၁၂ နာရီထက်နည်း) မြင့်တက်လာသည်
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းသည်အစာခြေဖျက်ခြင်းမှမဟုတ်ဘဲရလဒ်ဖြစ်သည်
အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာသည်
အထူးသဖြင့်အဓိကဇီဝအားဖြင့်မျိုချမိသောအာဟာရဓာတ်များသို့လှောင်ခြင်း၊
အသည်းဓာတုစက်ရုံ၊

အိမ်မွေးနွေးထွေးနိုးပါ၊ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ	၆၅
ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေတယ်	၁၀၀
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရပ်တည်သည်	၁၀၅
ဝတ်ဆင်လာသည်	၁၁၈
လက်နှိပ်စက်	၁၄၀
အဆင့် (၂.၆ မိုင်/နာရီ) တွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ပါ	၂၀၀
လက်သမား၊ အိမ်ကိုပန်းချီဆွဲသည်	၂၄၀
လိင်ဆက်ဆံခြင်း	၂၈၀
အဆင့်အလိုက်စက်ဘီးစီးခြင်း (၅.၅ မိုင်/နာရီ)	၃၀၄
နှင်းများကိုဇွေ့ယမ်းကာသစ်သားကိုမြင်ရသည်	၄၈၀
ရေကူးတယ်	၅၀၀
ပြေးခြင်း (၅.၃ မိုင်/နာရီ)	၅၇၀
လှေလှော်ခြင်း (လေဖြတ်ခြင်း/မိနစ် ၂၀)	၈၂၈
လှေကားထစ်များသို့တက်သည်	၁၁၀၀

ဇီဝဖြစ်စဉ်များ၏ လုပ်မှုနှုန်းကိုအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံအခြေအနေများကိုပံ့မှန်နှင့်နှုန်းယှဉ်ရမည် လိင်တူ၊ အသက်၊ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသောလူများအတွက်တန်ဖိုးများ ဤအချက်များအားလုံးသည်အခြေခံစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ ture ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူကြီးသည်အပူဒဏ်ပိုမြင့်သည် သေးငယ်တဲ့လူထက်ထုတ်လုပ်မှု; ဒါပေမယ့်စုစုပေါင်းအရဖော်ပြပါတယ် မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း (အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ကိုရောင်ပြန်ပစ်သော)။ မျက်နှာပြင်ရေယာ၏တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်တစ်နာရီကိုလိုကယ်လိုရီနှုန်းဖြင့် ပံ့မှန်အားဖြင့်အတူတူပါပဲ။

THE Basal ဇီဖြစ် RATE လွှမ်းမိုး Factor သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်းသည်အဓိကဖြစ်သော်လည်းနှုန်း၏တစ် ဦး တည်းသောအဆုံးအဖြတ်မဟုတ်ပါ basal ဇီဖြစ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ BMR သည် အတွန့်များသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း epinephrine သည်လည်း BMR ကိုလျော့စေသည်။

အုံသြစရာကောင်းတာက BMR ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နိမ့်ဆုံးမဟုတ်ဘူး နှုန်း အိပ်နေစဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် ၁၀% မှ ၁၅% BMR ထက်နိမ့်သည်၊ ပို့ပြည့်စုံသည်ဟုယူဆရသည် paradoxical အဆင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေသည် အိပ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၇၀ ကိုကြည့်ပါ) ။

THE Basal ဇီဖြစ် RATE ကိုင်းစာနှုန်းနာ အဆို့ပါ BMR သတ်မှတ်ချက်များတွင်အပူထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည်အလွန်နည်းနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေသေချာသည်။ အတူ **တိုက်ရိုက် calorimetry,** သားငယ်သည် insulated အခန်းထဲတွင်ထိုင်ပြီးရေမှတဆင့်လည်ပတ်နေသည် နံရံများ။ ရေထဲသို့ ဝ င်လာသောအပူခွံနှုန်းကွာခြားချက် အခန်းထဲ ဝ င်ခြင်းနှင့်အပြင်သို့ထွက်ခြင်းတို့သည်အပူဓာတ်ပမာဏကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လူတစ် ဦး သည်အစာစားပြီးရေထဲသို့ဖြတ်သွားသည် အခန်းမှတဆင့် ဒီနည်းကအထောက်အကူဖြစ်စေပေမယ့် အပူထုတ်လုပ်မှု၏မှန်ကန်သောတိုင်းတာမှုသည်လက်တွေ့မကျပါ၊ calorimeter chamber တစ်ခုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများပြီးနေရာယူသည် နေရာ။ ထို့ကြောင့်သွယ်ဝိုက်သောအဟန့်အတားဖြစ်စေသော ပို့ရှု လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းကို သတ္တုတုံးဖော်ရေးအတွက်အပူထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုကျယ်ပြန့်စွာဖို့ဖြိုးခဲ့သည်။ ဖြန့်ဝေသုံးစွဲသည်။ အတူ **သွယ်ဝိုက် calorimetry,** သာလူတစ်ဦး၏အိ အချိန်ယူနှစ်တစ်ခုစီကိုစုပ်ယူခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကိုရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ အဲဒါကိုသတိရပါ

အစားအစာ O_2 n CO_2 H_2O စွမ်းအင် (အများအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသည်- အပူ ထဲသို့)

ထို့ကြောင့်၊ ပမာဏအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည် O_2 နှင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအပူပမာဏ။ ဒီဆက်ဆံရေးမှာလည်း oxidized ခံရသောအစားအစာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ကာဗိုဟိုင်းဖြစ်သော် drates, ပရိုတိန်းနှင့်အဆီအို၏ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏလိုအပ်သည် $_2$ များအတွက် သူတို့၏ဓာတ်တိုးမှုနှုန်းကယ်လိုရိပမာဏကွာခြားသောအခါအထွက်နှုန်းတိုးစေသည် ဓာတ်တိုးခြင်း၊ အပူပမာဏကိုပျမ်းမျှခန့်မှန်းနိုင်သည် ပံ့မှန်ရောစပ်ထားသောအမေရိကန်တစ်မျိုးတွင်စားသုံးသော O_2 တစ်လီတာကိုထုတ်ထိုးမှုများနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်များသည်လည်းလျော့ကျလာသည်။

စာမျက်နှာ ၂၃

လူတစ် ဦး သည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုအမြဲထိန်းရန် (နှင့်) H_2O ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအသေးစားအပြောင်းအလဲများ မှလွဲ၍ တဲ့) အစားအစာကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိသောစွမ်းအင်သည်တူညီသောစွမ်းအင်ဖြစ်ရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှအသုံးစရိတ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အရှယ်ရောက်သူတစ်ဦးသည်တစ်နေ့လျှင် အချိန်ကြာမြင့်စွာမျှတသောပုံမှန်အလေးချိန်သည်ဤအချက်ကိုဆိုလိုသည် ရှေးရှည်ထိန်းသိမ်းရန်တိကျသော homeostatic ယန္တရားများရှိသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အကြားချိန်ခွင်လျှာ သိအိုရီအရစုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ပမာဏကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် အစားအစာ၏ပြင်းအားကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့် ကာယလှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီရန်အစားအစာသုံးမှုသည် ပြောင်းလဲနေသောဇီဝဖြစ်စဉ်အသုံးစရိတ်များနှင့်ကိုက်ညီရန်အစားအစာသုံးမှုသည် ကြားနေစွမ်းအင်မျှခြေကိုထိန်းသိမ်းရန်အဓိကနည်းလမ်းများ အဆင့် ကာယလှုပ်ရှားမှုသည်အဓိကအားဖြင့်ဆန္ဒအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည် အတွင်းပိုင်းအလုပ်များနှင့်အပူပမာဏကိုပြောင်းလဲစေသောယန္တရားများ ထုတ်လုပ်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိရန်အဓိကရည်ရွယ်သည် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်မျှခြေထက်

သို့သော်ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာအစာစားပြီးနောက်ထက်ပိုနည်းသည် အလိုရှိပါကဇီဝဖစ်စဉ်ကိုဆန့်ကျင်သောအပြောင်းအလဲလေးများဖြစ်ပေါ် နိုင်သည် ဥပမာအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ထိရောက်မှုကိုလျော့ကြေးပေးသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဒိုတိုက်ကျွေးခြင်းကိုတုံ့ပြန်ရာတွင်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ အချို့သော dieters များသည်ပထမဆုံးရှုံးပြီးနောက်ကုန်းပြင်မြင့်တွင်ညပ်လာကြသည် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင် (သို့) ပေါင်တော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။ ထို့အတူလျော့နည်းသွားသည် ဂုံပြန်မှုအတွက်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုထိရောက်မှုကိုလျော့ကျစေသည် နို့တိုက်ကျွေးခြင်းကြောင့်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရန်တမင်ကြိုးစားနေသောအလွန်ပိန်သောသူများ ဤဇီဝဖြစ်စဉ်အတွက်လျော့ကြေးငွေအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိနေသော်လည်း၊ အစားအသုံးမှုထိန်းညှိခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည် စွမ်းအင်ဟန်ချက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်း

အစားအစာစားသုံးမှုကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားသည့် hypothalamus အားဖြင့်

စွမ်းအင်ဟန်ချက်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအချိန်တိုထိန်းချုပ်နိုင်၏ ဦးဆောင်ကြောင်းအထောက်အထားများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ arcuate nucleus သည်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆန့်ကျင်သောပုံစံဖြင့် အုပ်စုငယ်တစ်ခုသည် *neuropeptide* ကို ထုတ်လွှတ်သည် *pro-pro* တို့မှရရှိသော *melanocortins* တို့ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ opiomelanocortin (POMC) သည်ဖြစ်နိုင်သောရှေ့ပြေးမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည် ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများဖြင့်မိုဝိုင်းကွဲပြားသောဟော်မုန်းများစွာကိုထုတ်လုပ်သည် ထုတ်ကုန်များ (စာမျက်နှာ ၆၇၂ ကိုကြည့်ပါ) ။ ₁ **Neuropeptide Y (NPY)** သည်အလွန်ဆုံးဖြစ်သည် အစွမ်းထက်အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်အစာကိုတိုးပွားစေသည် စားသုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသည်။ **Melanocortins**၊ အုပ်စုတစ်စု မတူညီသောအရာများတွင်အရေးကြီးသောအစုဝင်အလာကိုသိသောဟော်မုန်းများ အချို့သောဟော်မုန်းများတွင်ရပ်ဖျက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောအသားအရေအရောင်ရှိသည် အရှိန်အဝင် homeostasis တွင်မမျှော်လင့်သောခန်းကဏ္ဍစုခုထည့်သွင်းပြသခဲ့သည် *melanocyte-*

hypothalamus (hypothalamus) မှ ပို့ဆော်ဟော်မုန်း *(-MSH)* ကြောင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောဆဲလ်များတွင် အထူးသဖြင့် Melanocortins အခြေခံကြောင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုဖိစီးစေပြီးအစာစားသုံးမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျော့ကျစေသည် အရှိန်။ Melanocortins သည်အမွေဆက်ခံခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အခန်းကဏ္ဍမပါ ဝ င်ပါ လူများတွင်အရေပြားအရောင်ရှိသော်လည်းအရေပြား၌ MSH ကိုထုတ်လုပ်သည် နေရောင်မှခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းကိုတုံ့ပြန်မှုသည် mela အပေါ်တွင်တည်သည်။ nin (အရောင်ခြယ်ပစ္စည်း)-နေလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောဆဲလ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ Melanocortin ၏ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များတွင်အဓိကအရေးကြီးသည်မှာ hypo- thalamic -MSH သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေသည်။

သို့သော် NPY နှင့် melanocortins များသည်နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများမဟုတ်ပါ အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ဤ arcuate-nucleus ဓာတုစေတမန်များ၊

အစိုးရနှင့်အစုံလိုက်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဦးသန်းရောက်သည်
tors per se သည်စွမ်းအင်အ ဝ ငံ၊ စွမ်းအင်အထွက် (သို့) စုစုပေါင်းကိုစောင့်ကြည့်သည်။ ဤ များသည်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောအခြားအချက်များကိုဖြေဖျောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်
ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ပါဝင်မှု ၎င်းအစားအမျိုးမျိုးသောသွေးမရသောဓာတုပစ္စည်းများ NPY နှင့် melanocortins မှ upstream နှင့် downstream သို့
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာဟာရအခြေအနေဘယ်လိုအချက်ပြလဲ၊ ဘယ်လိုအချက်တွေလဲ အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။
အဆီများစွာသိုလှောင်ထားမှု (သို့) နိုတိုက်ကျွေးမွေးအခြေအနေသည်ထိန်းညှိရာတွင်အရေးပါသည်။ ထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ပါစည်းမျဉ်းများသွင်းအားစုများ
အစားအစာစားသုံးမှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ အစားအစာစားသုံးမှုထိန်းချုပ်မှုပေါ်မူတည်၍ nucleus သို့ပို့ရှည်သည်ထက်ပိုအရေးကြီးသည်။
signal တစ်ခုတည်းတွင်ပြောင်းလဲမှုများရှိသော်လည်းပေါင်းစည်းမှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ရေတိုထိန်းချုပ်ခြင်း
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်နှံပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပုံပိုးပေးတဲ့သွင်းအားစုများအစားအစာစားသုံးခြင်း (• ပုံ ၁၇-၂) ။
ergy အခြေအနေ။ အကွဲမျဉ်းစာမော်လီကျူးအချက်ပြအတူတကွသေချာကြောင်းသေချာပါစေ
အစာကျွေးခြင်းအပြုအမူသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ချက်ခြင်းပိုက်လျှာညီထွေဖြစ်သည် **ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်အားထိန်းညှိမှု: LEPTIN AND**
နှင့်ရေရှည်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ အချို့အချက်အလက်များအတွက်သုံးသည် **အင်ဆူလင်** အဆီဆဲလ်တွေ (၏သိပ်ပွညာရှင်များ " ဟူသောအယူအဆကို **adipocytes** adipose အတွက်)
အစားအစာစားသုံးမှုကိုအချိန်တိုထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့်အစာစားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် ကူညီသည်။ triglyceride အဆီသိုလှောင်ရန်နေရာအဖြစ်သာရှိသည်
အရွယ်အစားနှင့်ကြွမ်းနှုန်း ဒါတောင်မှ ၂၄ နာရီတာကာလအတွင်းမှာစွမ်းအင်ကပို များစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အတူလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲလာခဲ့သည်
မျိုးချစ်သောအစားအစာများတွင်ထိုနေ့အတွက်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည်။ **ရှည်** အင် homeostasis တွင်သူတို့၏တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍ Adipocytes များသည်အသားဓာတ်ကိုထုတ်ပေးသည်။
စုစုပေါင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကြားဆက်စပ်မှု
သို့သော်အချိန်ကြာမြင့်စွာအထွက်ကောင်းသည်။ တစ် ဦး အဖြစ်
ရလဒ်အနေနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ပမာဏ - ထိုကြောင့်၊
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်-ရေရှည်တွင်အတော်လေးမတည်ငြိမ်သေးပါ။
ထို့ကြောင့်, စွမ်းအင် homeostasis, ဆိုလိုသည်မှာစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ, ဂရုတစိုက်ဖြစ်ပျက်တယ်
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ လူ ဦး ရေနှင့် **POMC/CART** လူ ဦး ရေ *AgRP* သည် *agouti* ကိုဆိုလိုသည်။
ဆက်စပ်ပရိုတိန်း NPY နှင့် AgRP နှစ်ခုလုံးသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ *CART* ရပ်တည်ချက်
ကို ကင်းနှင့် *amphetamine* တို့နှင့်ပတ်သက်သောမှတ်တမ်း Melanocortins နှင့်
CART peptide သည်နှစ် ဦး စလုံးအစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းပေးသည်။ ရိုးရှင်းမှုအတွက်၊ ငါတို့လုပ်လိမ့်မယ်
ရာဖြစ်ရှုခင်းများ။ ocortins တို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုသာဆွေးနွေးပါ၊ ၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပါ
arcuate nucleus မှထုတ်လွှတ်သောအခြားဓာတုအချက်ပြများသည်အလားတူလုပ်ဆောင်သည်
လုပ်ဆောင်ချက်တွေ။

အရက်နာကျူ၏အခန်းကဏ္ဍ NP: NPY နှင့် MELANOCORTINS

စွမ်းအင်မျှခြေနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ပျော်စရာဖြစ်ပြီး
hypothalamus ၏ပုံစံ အဆိုပါ **arcuate နျူကလိယ** ဟာ hypo- ၏
thalamus သည်ရေရှည်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်

စာမျက်နှာ ၂၄



•ပုံ ၁၇-၂ **အစာစားသုံးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များ။**

eral ဟော်မုန်း, စုပေါင်းချေါ **adipokines,** ကြောင်းကစား im- ဝမ်းပိုက်အင်္ဂါများကိုဝန်းရံထားသည်။ Visceral အဆီပိုများပါတယ်
စွမ်းအင်မျှခြေနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများ ထို့ကြောင့် adipose နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နှလုံးကြိတ်ထွားခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
တစ်သျူးကိုယခုအခါ endocrine ဂလင်းဟုသတ်မှတ်သည်။ ▲ ဇယား ၁၇-၂ အပေါ်ရောဂါသည် ပို၍ အပေါ်ယံကြည့်လျှင် ပို၍ အန္တရာယ်နည်းသည်
လူသိအများဆုံး adipokines ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိမ်းမြားပေးသည်။ အချို့ **အရေးကြီး** အောက်တွင်စုပြုံနေသော **subcutaneous အဆီ** (subcutane-
pokines များကိုသိုလှောင်ထားသောအဆီများမှသာထုတ်လွှတ်သည်။ ဥပမာ *leptin* bus အဆီသင် pinch နိုင်ပါတယ်ကောင်ဆီဥကိုဖြစ်ပါသည်။) တချို့ကကဲ့သို့ *adiponectin,* နေကြပါတယ်
စွမ်းအင်မျှခြေတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍပါဝင်သည်။ အချို့က inflamma ကဲ့ထိုင်းသော "adipokines" Adiponectin သည်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်စေသည်

adipocytes ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗိုက်ဆိုင်ရာဇုန်တွင်အဓိကအားဖြင့်ရှိသည်။ အခြားကိုယ်ထည်အင်္ဂါများတွင်လည်း အဆီသိုလှောင်ခြင်းများရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး ပိုများပြားသည်။ အဆီဆဲလ်များသည် ဆဲလ်အရွယ်အစားကြီးမားပြီး အဆီသိုလှောင်ခြင်းအများစုကို ဆဲလ်အတွင်းရှိ အဆီဆဲလ်များတွင် သိုလှောင်ထားသည်။ အဆီဆဲလ်များသည် ဆဲလ်အတွင်းရှိ အဆီသိုလှောင်ခြင်းများ

plecaffcrent အာရုံကြောဆဲလ်သွင်းချက်သည် အစာအိမ်နှာခြင်း၏အထိုင်းအတာကိုညွှန်ပြသည်။ ဟင်းမာမှု)။ ထိုနောက်ရလဒ်တို့ cholecystokinin အိုအမျိုးဆိုးအာရုံစိုက်သည်။ ဤ satiety အချက်ပြမှု၏အရေးကြီးသည်။

Glucagon-like peptide-1	Arcuate nucleus ၏ hypothalamus	လျော့ကျသွားသည်
Leptin	Adipose တစ်သျှူး	လျော့ကျသွားသည်
အင်ဆူလင်	Endocrine ပန်ကရိယ	လျော့ကျသွားသည်
Ghrelin	အစာအိမ်	တိုးလာသည်
PPY ၃၄၆	အကြီးနှင့်အငယ် အူ	လျော့ကျသွားသည်
Orexins	ဘေးတိုက် hypothalamus	တိုးလာသည်
ဟော်မုန်း	Paraventricular တိုဖြစ်သည် hypothalamus မှ	လျော့ကျသွားသည်
Cholecystokinin	အူသိမ်	လျော့ကျသွားသည်
အစာအိမ်	အစာအိမ်	လျော့ကျသွားသည်

SATOETY လက္ခဏာ Cholecystokinin အဖြစ် CHOLECYSTOKININ

(CCK) သည်အစာအိမ်နှင့်အူသပ်းကြောင်းမှထွက်လာသောဟော်မုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစာချေဖျက်နေစဉ် duodenal mucosa သည်အရေးကြီးသည်။ အစားအစာများ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိရန် satiety အချက်ပြသည်။ CCK ကိုလျှို့ဝှက်ထားသည် အူသိမ်၌အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုကိုတုံ့ပြန်သည်။

အစာခြေစနစ်အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတဆင့် CCK သည်ကူညီပေးသည်။ ဤအာဟာရဓာတ်များကိုအစာချေဖျက်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်း (စာမျက်နှာ ၆၃၇ တွင်ကြည့်ပါ။ ဤသို့ဖြစ်သည်။ ဤသွေးမှဆင်းသက်သောအချက်သည်အဘယ်သူ၏အထွက်နှုန်းဖြစ်သနည်း စားသုံးမိသောအာဟာရဓာတ်ပမာဏတို့နှင့်လည်းဆက်နွယ်နေသည်။

အစာစားပြီးသောအခါအားအင်ပြည့်သွားပြီဟူသောသဘောသို့ရောက်သည် သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်အစာကြေပြီးစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ငါတို့ခံစားရတာမျိုးစုံတို့ဆိုင်များအားဖြည့်ရန်လုံလောက်သောအစားအစာရသောအခါကျေနပ်သည် ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပမာဏနည်းနေသော်လည်းအစာခြေလမ်းကြောင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မျိုချမိသောအစာမစားမီအဘယ့်ကြောင့်ရပ်တန့်ရသည်ကိုရှင်းပြသည် ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။

▲ ဧယား ၁၇-၃ သည်အလိုအလျောက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအရေးပါစွာထိခိုက်စေသည်။ ဤသည်ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည် tory သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုအချက်ပြသည်။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ထိုကြောင့်ဝေးကျနော်တို့ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောအလိုအလျောက်အချက်ပြချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည့် အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရေစားသုံးမှုနည်းတူလူတွေရဲ့အစာ အလေ့အထများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ဖြင့်ပုံဖော်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ အများအားဖြင့်အစာစားရန် (သို့) ရပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချပါ ငါတို့ဗိုက်ဆာသည်ဖြစ်စေ၊ အစာပြည့်သည်ဖြစ်စေအားဖြင့်သာဆုံးဖြတ်သည် တန်းစီ မကြာခဏ၊ ငါတို့သည်အလေ့အကျင့်မရှိသော (တစ်နေ့လျှင်သုံးနပ်စားသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေအချို့ tinuum) သို့မဟုတ်လူမှုရေးထုံးစံများကြောင့် (အစားအစာသည်အဓိကကျသောကစားလေ့ရှိသည်။ ဖျော်ဖြေရေး၊ အားလပ်ရက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါ) ကောင်းတာတောထဲတစ်သျှူးစတိုးဆိုင်များ pose; အဝလွန်ခြင်းအတွက်မတရားနယ်နိမိတ်သည် မိသားစုဖိအားဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍“ သင်ပန်းကန်ပြားကိုမသွားခင်သန့်ရှင်းပါ စားပွဲ” - စားသုံးသည်ပမာဏအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

ထိုပြင်အစာစားခြင်းမှရရှိသောပျော်ရွှင်မှုပမာဏ အစာကျွေးတဲ့အကျင့်ကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပျော်စရာအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်း အရသာ၊ အနံ့နှင့်ဖွဲ့စည်းမှုသည်အစာစားချင်စိတ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ဒါကိုကြွက်တွေရဲ့မှန်းသပ်မှုတစ်ခုမှာပြသခဲ့တယ် အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလှူသားအစားအစာများကိုသူတို့၏ရွေးချယ်မှုကို ၇၀% မှ ၈၀% အထိအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းဖြင့်အဝလွန်လာသည်။ အခါကြွက်များသည်သူတို့၏ပုံမှန်မဲပြားပုဆိုးများဖြစ်သော်လည်းအာဟာရပြန်စားရန်ပြန်တစ်ခဲ့ကြသည် မဟာမိတ်ဟန်ချက်ညီသောကြွက် chow, သူတို့အဝလွန်အဖြစ်လျင်မြန်စွာပြောင်းပြန်ဖြစ်အဝလွန်ခြင်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာသည်နှင့်အမျှ kilocalo သူတို့၏အစာစားသုံးမှုကိုဇီဝကမ္မဗေဒအရတစ်ဖန်ထိန်းချုပ်ထားသည် ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ရန်သုံးသည်ထက်အစာကိုမျိုချသည် အရသာရှိသောပူဇော်သက္ကာများအတွက် hedonistic တိုက်တွန်းချက်များကြောင့်မစ္စတာ/မစ္စတာ/မစ္စတာ/

ရှားစွာဝန်ခန့်ရေးအိုးရုံးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၏ ကလေးမွေးဖွားမှုများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၏ ကလေးမွေးဖွားမှုများ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ကွန်ပျူတာများတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပြီး

အချိန်ကြာလာလည်နှင်အမျှအင်္ဂါနှင်းများကပေါင်းများထမ်တိုးလာနိုင်သည်။ ကျဿသမ္ဘာရှည်လျားသောဓာရင်းရှိနေသော်လည်းအကြောင်းအရင်းနှင့်မတ်သက်၍ ကျန်ဖိတ်၏အဝါပဉ္စာဖြစ်သည်။ အထောက်အထားများအရအ ဝ လွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိနေသေးသည်

စာမျက်နှာ ၂၉

anorexia nervosa ဝေဒနာခံစားနေရသောသူများရှိသည့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရန်ရောဂါဗေဒကြောက်ရွံ့ခြင်း

အ ဝ လွန်ခြင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်အာဟာရချို့ယွင်းမှုဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည် အစာလျှော့စားခြင်း၏သိသာထင်ရှားသည့်အကြောင်းရင်းများ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအောက်တွင်စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊ အစာမျိုချခြင်း (သို့) အစာချေဖျက်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကျဆင်းခြင်း

အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းသည်နားလည်ရခက်သောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည် ထင်ရှားသောလက္ခဏာမှာ **anorexia nervosa ဖြစ်သည်။** ဒီရောဂါဝေဒနာရှင်၊ အများအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များတွင်အ ဝ လွန်ခြင်း၊ အဆီဖြစ်လာမှာကြောက်တယ်။ သူတို့မှာပုံပျက်ပန်းပျက်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရှိသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လုပ်ရပ်တွေထက်ပိုလေးလံတယ်လို့မြင်ယောင်ဖို့ မဟာမိတ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစားအသောက်ကျိုက်တာကြောင့်သူတို့ကနည်းနည်းသွားတယ်လို့ ထို့ကြောင့်အစာတစ်ခဲ။ အစာငတ်ခံနိုင်သည် သူတို့ကိုယ်သူတို့သေစေသည်။ အခြေအနေ၏အခြားလက္ခဏာများပါဝင်သည် ရာသီလာခြင်းမရှိခြင်း၊ ဟော်မုန်းများစွာကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ods နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နည်းသည်။ ဒီစာနာထောက်ထားမှုဟုတ်မဟုတ်မရှင်းမလင်း ဝိုင်းတွင်းမှာမူ။ toms များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အာဟာရရှိုက်တဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသည်။ မူလတန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစာစားခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်မပြုပါနှင့် hypothalamic ချုတ်ယွင်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများစွာကအောက်ခြေ-ပြဿနာသည်ဇီဝဗေဒထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ ပညာရှင်များသည် anorexics သည်စွဲလမ်းစေသောအရာများဖြစ်နိုင်သည် dogenous opiates၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သော morphinelike ကဲ့သို့အရာများ (ကြည့်ပါ p ၁၉၂) နာတာရှည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်စဉ်းစားသည်။

als နှင့် ၉၆.၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၅.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထိတစ်နေ့တာလုံးကွဲပြားသည် နံနက်ခင်း၌ညနေ ၉၉.၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ ၃၇.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ၊ မူမမှန် ၉၈.၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၆.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ထိုပြင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကြောင့်မည်သူမျှမရှိ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အပူချိန်ကွဲပြားသည်။ thermoregula မှ အပြန်အလှန်ထိန်းသိမ်းခန္ဓာကိုယ်ကို *cen* အဖြစ်အဆင်ပြေစွာရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ *tral core* ကို အပြင်ဘက်အခွံ ဖြင့်ဝန်းရံထားသည် ။ အတွင်းအပူချိန် ဝမ်းဗိုက်နှင့် thoracic တိုပါ ဝ ငံသောအတွင်းစိတ် ကိုမှတ်တွင်းအင်္ဂါများ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့်အရိုးကြွက်သားများ၊ အပူဓာတ်ယွင်းအားဖြင့်အတော်အတန်မတည်ငြိမ်။ ဤအတွင်းပိုင်းအတွင်းစိတ် **လက္ခဏာ ture** သည်ငင်း၏ homeostatic ကိုထိန်းသိမ်းရန်တိကျသောစည်းမျဉ်းများရှိသည် ခန္ဓိ core တစ်သျှူးများသည်အတော်အတန်အဆက်မပြတ်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည် အပူချိန် ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၇.၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)

အရေပြားနှင့်အရေပြားအောက်ရှိအဆီသည်အပြင်ဘက်ခွံဖြစ်သည်။ ၌ core အတွင်းရှိအဆက်မပြတ်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မတူဘဲ၊ အခွံ၏အတွင်းပိုင်းလက္ခဏာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အေးပြီး sub ကွဲလွဲနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုမှာ ၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၂.၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အမှန်တော့မင်းအတိုင်းပါပဲ အရေပြား၏အပူချိန်သည်တမင်တကာကွဲပြားသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည် core ၏အပူအနိမ့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီထိန်းချုပ်သောအတိုင်းအတာ

ကိုယ်တကူးစောင့်ကြည့်နိုင်သောကိုယ် **အပူချိန်ထိန်းရန်နေရာ** များစွာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာများကိုသုံးသည်။ ပါးစပ်နှင့် axillary (ချိုင်းကြားအောက်) အပူချိန်များသည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း rectal temperature သည်ပျမ်းမျှ ၁ ° F ခန့်ရှိသည် (0.56 ° C) ပိုမြင့်သည်။ ဒါ့အပြင်အပူချိန်တိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ် နားစည်မှထွက်လာသောအပူဓာတ်ကိုစစ်ဆေးသောတူရိယာ မကြာသေးမီက device သည် tempo ကိုတိုင်းတာသော temporal scanner ဖြစ်သည်။ temporal artery ရှိသွေး၏လက္ခဏာများ။ ယာယီ scanner သည်ခန္ဓာကိုယ်မှအပူဓာတ်ကိုသဘာဝအတိုင်းထုတ်လွှတ်သည်။ ဟိ ကွန်ပြူတာသုံးတူရိယာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်မှညင်သာစွာပွတ်သပ်သည် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် ၂ မိလီမီတာထက်လျော့နည်းသည် နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Temporal temperature သည် rectal tem ထက်ပိုနိုးသည်။ perature သည်ခံတွင်းအပူချိန်ထက်အကောင်းဆုံးနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည် core အပူချိန်၏အပူချိန်နှင့်တူညီသောကြောင့် နှုလုံးမှထွက်သောသွေး၏လက္ခဏာများ။ သို့သော်တစ်ခုမှမပါ

CORE အပူချိန် တွင်ရှိနေသော်လည်း core အပူချိန်ကိုအတော်အတန်အဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားသည်၊ အချက်များစွာရှိသည် ၎င်းကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစေပါ။

၁။ လူအများစု၏ core temperature သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကွဲပြားသည် နေ့တွင် ၁.၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိပြီးအနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသည် နံနက် (၆ မှ ၇ နာရီ) မတိုင်မီနံနက်နှင့်အမြင့်ဆုံးသို့ ညနေခင်း (ညနေ ၅ နာရီမှ ၇ နာရီ) ဤပြောင်းလဲမှုသည်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ပင်မဇီဝစည်းချက် (သို့) “ ဇီဝနာရီ” (စာမျက်နှာ ၆၈၅ ကိုကြည့်ပါ) ။

၂။ အမျိုးသမီးများသည်ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ၌လစဉ်စည်းချက်ကိုခံစားသည်။ သူတို့ရာသီစက်ဝန်းနှင့်ဆက်စပ်နေတယ်။ အဓိကအပူချိန် ၎င်းပျမ်းမျှ ၀.၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင်နောက်ဆုံးနှစ်ဝက်အတွင်းပိုမိုမြင့်မားသည် မျိုးဥထွက်ချိန်မှဝမ္မတာလာချိန်အထိစက်ဝန်း နူးညံ့သည် ပရိဂျက်စတီရုန်းဟော်မုန်းမြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟုယူဆရသည်။

၆၅၀ အခန်း ၁၇

စာမျက်နှာ ၃၀

အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း

လူသားများသည်အများအားဖြင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထက်အေးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဘဲအပူချိန်ကိုခံတွင်းညီမျှစေသည်။ A ပို ဒါပေမယ့်သူတို့ကအပူကိုအမြဲကူညီပေးတာကြောင့်၊ temporal scanner ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်သည်။ အပူထုတ်လုပ်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင်မူတည်သည် temporal artery ရှိသွေး၏လက္ခဏာများ။ ယာယီ အစားအစာမရရှိသောဇီဝဖြစ်စဉ်လောင်စာဆီများ၏ဓာတ်တိုးမှု။ scanner သည်ခန္ဓာကိုယ်မှအပူဓာတ်ကိုသဘာဝအတိုင်းထုတ်လွှတ်သည်။ ဟိ

ဦး တည်ရာတစ်ခုခုတွင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်း ကွန်ပြူတာသုံးတူရိယာကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်မှညင်သာစွာပွတ်သပ်သည် လုပ်ဆောင်ချက်- အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းသည်ဆဲလ်များဓာတုပစ္စည်းများကိုမြန်စေသ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်အတွက် ၂ မိလီမီတာထက်လျော့နည်းသည် ကယ်လိုရီတိုံပြန်မှုများသော်လည်းအပူချိန်ကျဆင်းခြင်းသည်ယင်းကိုနှေးကွေးစေသ ခန္ဓိနောက်ဤသေးငယ်သောဝင်းဒိုးအောက် ၂ မိလီမီတာထက်လျော့နည်းသည် တုံပြန်မှု။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆဲလ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကအတက်အကျကိုခံနိုင်ရည်အားနည်းတဲ့အပူချိန်အတွင်းအပူချိန်၊ လူသားများသည်ခန္ဓာကိုယ်ကို homeostatically ထိန်းသိမ်းသည် နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Temporal temperature သည် rectal tem ထက်ပိုနိုးသည်။ ဆဲလ်များဇီဝဖြစ်ပျက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်အပူချိန် perature သည်ခံတွင်းအပူချိန်ထက်အကောင်းဆုံးနှင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည် တည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံနဲ့နေခဲ့တယ်။ အပူလွန်ကဲခြင်းသည်အအေးထက်ပိုပြင်းထန်သည်။ core အပူချိန်၏အပူချိန်နှင့်တူညီသောကြောင့် ing ။ တော်ရုံတန်ရုံခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်တာတောင်ငရဲသေးတယ် နှုလုံးမှထွက်သောသွေး၏လက္ခဏာများ။ သို့သော်တစ်ခုမှမပါ အာရုံကြောများချိုယွင်းခြင်းနှင့်နောက်ပြန်လှည့် ်၍ မရသောအသားတော်ချို့တဲ့ခြင်းကိုခံစားရ အပူချိန်၊ ၎င်းတို့ကိုအကြွင်းမဲ့ညှဉ်းပြစ်ခြင်းသည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကျဆင်းခြင်းကိုခံစားရ လူအများစုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းအပူချိန်များလာသောအခါတက်ခြင်းကိုခံစားရသော်လည်း ၎င်းတို့ကိုအကြွင်းမဲ့ညှဉ်းပြစ်ခြင်းသည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်၊

ဥ၅၁ အပူချိန်ထိန်းညှိခြင်း အပူပြန်လွှတ်ခြင်းနှင့် အပူမျိုးစုံ
အပူချိန်လက်ခံသောအနေအထားတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် core ထဲ၊။-
အေးမြသောရာသီဥတုဒဏ်ရိုက်ခတ်ခံရသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်
ပူပြင်းသောရာသီဥတုဒဏ်ခံရသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်

ထိုကြောင့်ပင်မအပူချိန်သည်အစွန်းများအကြားကွဲပြားနိုင်သည်
၉၈ ဒီဂရီနှင့် ၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ခန့်ရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဒီဂရီအနည်းငယ်သာ ကွာခြားတတ်ကြသည်။
ဤနိုင်းယှဉ်တည်ငြိမ်မှုကို thermo မျိုးစုံဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
hypothalamus မှညှိနှိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းယန္တရားများ

အပူထည့်သွင်းမှုသည်အပူအထုတ်ကိုထိန်းညှိပေးရမည့် တည်ငြိမ်သော core အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။

core temperature သည်ခန္ဓာကိုယ်၏စုစုပေါင်းအပူဓာတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
တဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်သို့အပူဓာတ်ဖြည့်သွင်းမှုသည်အပူထုတ်လွှတ်မှုကိုအဓိကထိန်းညှိပေးရမည်။ ပြောင်းမှုဆိုင်ရာယန္တရားလေးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်၊
အဆက်မပြတ်စုစုပေါင်းအပူပါဝင်မှုနှုန်းတည်ငြိမ်သော core အပူချိန်
perature (• ပုံ ၁၇-၃) ။ အပူရရှိမှုအားဖြင့် အပူထည့်သွင်း သည်
external environment နှင့် internal heat production တို့မှ၊
ငင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအပူအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အများစုကိုသတိရပါ
အပူအဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤအပူသည်အဓိကအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အရေးကြီးသော
စာပေ အမှန်အားဖြင့်လိုအပ်သည်ထက်ပိုများသောအားဖြင့်အပူကိုထုတ်ပေးသည်
ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းရန်ပိုလျှံသောအပူရရှိမည်
ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ Exit မှအပူဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် အပူအထွက် သည်
ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်များကိုပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်သို့ထားပါ။
အပူအ ဝ င်နှင့်အထွက်ကြားချိန်ခွင်လျှာသည်မကြာခဏကွဲထွက်နေသည်။
ရည်ရွယ်ချက် (၁) အတွင်းအပူထုတ်လုပ်မှုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
အထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိန်းညှိမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ
အပူထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်စေသောလေ့ကျင့်ခန်း၊ နှင့်
(၂) ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊

•ပုံ ၁၇-၃ အပူထည့်သွင်းမှုနှင့်အထွက်။

အတွင်းရောင်ခြည်ဖြင့်အပူလဲလှယ်ခြင်း၊ conduction, convection နှင့် evaporation တို့ဖြစ်သည်။

ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အကြားအပူဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) အပူတိုးခြင်း
ကိုယ်ခန္ဓာမျက်နှာပြင်နှုန်းတို့၏ ronment ပြုလုပ်ရမည်။
ပတ်ပတ်လည်။ အပူဒဏ်ကိုထိန်းချုပ်သောသဘာဝရုပနိယာမများနှင့်တူညီသည်
သက်မဲ့အရာဝတ္ထုများအကြားကူးပြောင်းခြင်းကိုလည်းလွှဲပြောင်းထိန်းချုပ်သည်
ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားအပူ အမှုအရာ-
အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အပူသည်အပူ၏ပြင်းအားကိုတိုင်းတာသည်
အရာဝတ္ထုအတွင်း ထို့ကြောင့်အပူသည်ဌင်း၏အောက်သို့အမြဲရွှေ့လျားနေသည်
concentration gradient - ဆိုလိုသည်မှာ **thermal gradient** မှ ဆင်း သည်
တစ်ဦးအေးဒေသတစ်ပူနေး (*thermo* နည်းလမ်းများ "အပူ") ။ ခန္ဓာကိုယ်က
convection နှင့် အငွေ့ပျံခြင်း။

RADIATION **Radiation** သည်အပူစွမ်းအင်မှထုတ်လွှတ်သည်
နေးထွေးသောကိုယ်ခန္ဓာ၏မျက်နှာပြင်မှ **လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၊**
သို့မဟုတ် အာကာသကိုဖြတ်သန်းသွားသော **အပူလှိုင်းများ** (• ပုံ ၁၇-၄ က)
ဤအပူလှိုင်းများသည်စွမ်းအင်သည်အရာ ဝ တ္ထုကိုရိုက်ခတ်မိုးစုပ်ယူသောအခါ
လှိုင်းရွှေ့လျားမှု၏စွမ်းအင်သည်အတွင်း၌အပူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်
အရာဝတ္ထု လူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အပူဆုံးရှုံးမှုအရင်းအမြစ်နှင့်ထုတ်လွှတ်သည်
အပူရရှိသောအရင်းအမြစ်မတောက်ပသောစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူသည်။ ဟိသလား
ကွဲပြားမှုပေါ် မူတည်၍ ခန္ဓာကိုယ်မှအပူဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခြင်း
အရေပြားမျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်များအကြားအပူချိန်မြင့်တက်သည်
ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခြင်းအရာများ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် net trans
ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်အပူသည်ပို့နေးသောအရာများမှအမြဲဖြစ်သည်
အအေးပိုသောသူများသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအရာဝတ္ထုများမှဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်အပူကိုရရှိကြသည်
နေရောင်၊ ရေတိုင်ကီကဲ့သို့သို့မဟုတ်အရေပြားမျက်နှာပြင်ထက်ပိုပူသည်
မှတ်တမ်းများကိုမီးရှို့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်အပူဆုံးရှုံးသည်
သူ့မျက်နှာပြင်ထက်ပိုအေးသောပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောအရာများ
နံရံများ၊ ပရိဘောဂများသို့မဟုတ်သစ်ပင်များကဲ့သို့အရေပြား၏မျက်နှာပြင်
ပျံမ်းမျှအားဖြင့်လူသားများသည်ငင်းတို့၏အပူစွမ်းအင်၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုဆုံးရှုံးသည်
ဓါတ်ရောင်ခြည်မှတဆင့်

CONDUCTION **Conduction** ဆိုသည်မှာအပူနှစ်ခုကြားအပူကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန် jects
အပူသည်ငင်း၏ thermal gradient မှအောက်သို့ရွှေ့လျားသည်
မော်လီကျူးမှလွဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပိုပူသောအေးသောအရာဝတ္ထုသို့
မော်လီကျူးသို့ ecule မော်လီကျူးအားလုံးသည်အဆက်မပြတ်တုန်ခါနေသည်
ပူနွေးသောမော်လီကျူးများသည်အအေးထက်ပိုမြန်စွာရွှေ့လျားသည်
သူတွေ့ မတူညီသောအပူပါဝင်မှုရှိသောမော်လီကျူးများသည်တစ်ခုချင်းစီကိုထိသောအခါ
အခြား၊ ပိုမြန်သော၊ ရွှေ့လျားပိုနွေးသောမော်လီကျူးသည်အအေးပိုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
မော်လီကျူးသည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာရွှေ့လျားသွားပြီးငင်းကိုနွေးစေသည်
cooler မော်လီကျူး။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်မူလပူနွေးသောအရည်
ecule သည်နှေးကွေးလာသည်နှင့်အမျှငင်း၏အပူစွမ်းအင်အချို့ဆုံးရှုံးသည်

စာမျက်နှာ ၃၁



• ပုံ 17-4 **အပူလွှဲပြောင်း၏ယန္တရားများ။** မြှားများ၏ ဦး တည်ချက်သည်ဒရုန်းကိုသရုပ်ဖော်သည်။
အပူကူးပြောင်းခြင်း။

CONVECTION ဟူသောဝေါဟာရသည် **convection ဖြစ်သည်**
အပူစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်
အားဖြင့် လေထု (သို့မဟုတ် ရေ) ရေစီးကြောင်း။ အဖြစ်
ခန္ဓာကိုယ်မှအပူဓာတ်ကိုစုပ်ယူခြင်းဖြင့်အပူဆုံးရှုံးသည်
ပတ် ဝ န်းကျင်တွင်အေးသောလေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောလေ
အရေပြားနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ပြေလည်စေပါသည်
ပူနွေးလာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွေးထွေးတဲ့လေကပိုပေါ့ပါးတယ်
အေးသောလေထက်နွေးထွေးသည်
အေးသောလေသည်ရွှေ့လျားနေစဉ်လေသည်မြင့်တက်လာသည်
အရေပြားရဲ့ဘေးနားမှာလစ်လပ်နေတဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့
နွေးထွေးသောလေကို ဖြစ်စဉ်ကဒါပဲ
ထပ်ခါတလဲလဲ (• ပုံ ၁၇-၄ဂ) ။ ဒါတွေလေ
convection ဟုခေါ်သည်
ရေစီးကြောင်းများ၊ အပူများကိုသယ်ဆောင်ရန်ကူညီသည်
ခန္ဓာကိုယ်။ convection cur မပါဘဲ၊
ငှားရမ်းခများ၊ နောက်ထပ်ပူပန်မှုမရှိနိုင်ပါ။
conduction ဖြင့်အရေပြားမှစုပ်ယူသည်
အလွှာ၏အပူချိန်ကိုတစ်ကြိမ်
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝိုက်ကိုချက်ချင်းလေ ဝ ်သည်
အရေပြားအပူချိန်နှင်းညီမျှသည်။
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု
convection ၏ dissipating ၏လုပ်ငန်းစဉ်
ခန္ဓာကိုယ်မှအပူကိုမြှင့်တင်ပေးသည်
နေရာအနံ့လေကိုအတင်းရွှေ့ခိုင်းသည်
ပြင်ပလေအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်
ဖြစ်ပေါ်စေသောရွှေ့လျားမှုများကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများ
လေ (သို့) ပန်ကာ (သို့) ရွှေ့လျားမှုကြောင့်
ခန္ဓာကိုယ်သည်လေကဲ့သို့ဖြတ်သန်းသည်
စက်ဘီးစီးခြင်း အတင်းလုပ်ပေတော့
လှုပ်ရှားမှုသည်လေကိုလွှင့်စေသည်
နွေးထွေးမှုနှင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်နွေးထွေးစေသည်
ငင်းသည်ပိုအေးသောလေနှင့်ပိုမြန်သည်
စုစုပေါင်းအပူပမာဏပိုများနိုင်သည်

အနည်းငယ်အေးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်အပူချိန်ကိုလုံလောက်သောအချိန်ပေးထားသည့်အခါ ထိတွေ့သောအရာဝတ္ထုနှစ်ခုသည်နောက်ဆုံးတွင်ညီမျှသည်။

conduction အားဖြင့်အပူလွှဲပြောင်း၏နှုန်းအပေါ်မူတည် *tem-* ထိမိသောအရာများနှင့် သီအိုရီ အကြား ခြားနားချက် ပါဝင်သောအရာများအားမှားယွင်းစွာ စီးဆင်းမှု (ဆိုလိုသည်မှာမည်မျှလှုပ်ကူသည် အပူကိုအရာဝတ္ထုများ၏မော်လီကျူးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။) အပူပေးနှုန်းပါတယ် အရေပြားနှင့်ထိတွေ့သောအခါ conduction ဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခြင်း ကောင်းသောစပယ်ယာ (• ပုံ ၁၇-၄ ခ) ။ နှင်းဘောလုံးတစ်လုံးကိုကိုင်တဲ့အခါ ဥပမာ၊ အပူသည်ရွှေ့လျားနေသောကြောင့်သင်၏လက်သည်အေးလာသည် သင်၏လက်မှနှင်းဘောလုံးသို့သယ်ဆောင်သည်။ ပြောင်းပြန်လိုက်တာ မင်းအပူခံပြားကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတခုမှာသုံးတယ်၊ တစ်တံတပိုင်းပူလာတယ် အပူသည်ခန္ဓာကိုယ်မှ pad သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းသည်။

ထိုနည်းတူစွာ၊ သင်အပူကိုဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) အပူကိုရနိုင်သည် မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့လေထု ၏ ဦး တည်ချက် အပူလွှဲပြောင်းမှုသည်လေအေး (သို့) ပိုပူသည်ဖြစ်စေမှုတည်သည်။ မင်းရဲ့အသား အရေထက် စုစုပေါင်း၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် အရေပြားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြား အပူဖလှယ်မှုသည်နေရာယူသည် လေထုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော conduction တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့် conduction ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အပူ ductor ။ (ဤအကြောင်းကြောင့် ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ရေကူးကန်ရေ (၂၆.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တူညီသောအပူချိန်တွင်လေထက်ပိုအေးသည်။ အပူသည် ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်မှရေထဲသို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာကောက်ယူသည်။ ၎င်းသည်ဆင်းရဲသောလေထုထက်ကောင်းသောစပယ်ယာဖြစ်သည် စပယ်ယာ။)

ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတည်ငြိမ်စေသည် ဆောင်းရာသီမှာလေပြင်းတိုက်တဲ့နေ့တွေရှိတယ် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်တွင်အေးသောနေ့များထက်ပိုအေးသည်။ ဘို့ ဤအကြောင်းကြောင့်ရာသီဥတုခန့်မှန်းသူများသည်အပူအဆက်ကိုတိုထွင်ခဲ့ကြသည် *wind chill factor* (ဘယ်လောက်အေးသလဲ) ။

ရေငွေ့ပျံ စဉ်အတွင်း **ရေငွေ့ပျံ** အရေပြားမျက်နှာပြင်ကနေ, ရေမှအရည်သို့ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအပူသည် eous state သည်အရေပြားမှစုပ် ယူ၍ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးမြစေသည် (• ပုံ 17-4d) အပူငွေ့ဆုံးရှုံးခြင်းသည်သင့်ကိုပိုအေးစေသည် မင်းရဲ့ရေချိုးဝတ်စုံကခြောက်သွေ့တာထက်စိုစွတ်တဲ့အခါ အငွေ့ပျံခြင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှအပူများဆုံးရှုံးခြင်းသည်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ tory airways နှင်အရေပြားမျက်နှာပြင်မှ အပူဓာတ်သည် ရေဓာတ်ရရှိမှုကြောင့်သက်တမ်းကုန်လေထဲတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်မှတဆင့်ငှင်း၏အငွေ့ထွက်လာသည်။ ထို့အတူအရေပြားသည်လုံးဝရေလုံမဟုတ်သောကြောင့် H ₂ O ဖြစ်သည် မော်လီကျူးများသည်အရေပြားပေါ်တွင်အမြဲပျံနှုန်းသွားပြီးအငွေ့ပျံသွားသည်။ အရေပြားမှအဆက်မပြတ်ရေငွေ့ပျံခြင်းသည်လုံးဝမဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါ။ ဤရွေ့ကား passive evaporative heat-loss ဖြစ်သည် ဖြစ်စဉ်များသည်ဇီဝကမ္မဗေဒထိန်းချုပ်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲရှေ့ဆက်သွားရမည် အလွန်အေးသောရာသီဥတု၌ပင်ပြဿနာသည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။

ချွေး ထွက်ခြင်းသည်အောက်တွင်လှုပ်ရှားနေသောအငွေ့ပျံစေသောအပူဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် sympathetic အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု။ အငွေ့ပျံနှုန်းဆုံးရှုံးမှုနှုန်း

စာမျက်နှာ ၃၂

ချွေးထွက်နှုန်းအမျိုးမျိုးကိုတမင်တကာချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အရေးကြီးသော homeostatic ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည် လိုအပ်သောပို့လျှဲအပူ တကယ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အရေပြားသည်အပူချိန်ထက်ကျော်။ ချွေးထွက်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်အပူကိုရရှိသောကြောင့်အပူဆုံးရှုံးမှုအတွက် နှင့်ဤအခြေအနေများအောက်တွင် conduction ပုံမှန်အခြေအနေမှာ လေ့လာမှုအရတစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှချွေး ၁၀၀ မီလီလီတာထုတ်လုပ်သည်။ ဒီ ပုပြင်းသောရာသီဥတုတွင် ၁.၅ လီတာအထိမြင့်တက်ပြီးတက်သည် ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ် ၄ လီတာ

ချွေး သည်ဆားမှရသောဆားရည်ပျော်ရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်သို့တက်တက်ကြွကြွတက်သွားသည်။

ecrine ချွေးဂလင်းများ ဖြင့်အရေပြား၏မျက်နှာတစ်ပြင် လုံးဥပြန့်နှံ့သွားသည် ခန္ဓာကိုယ်။ ဤကြွေကွင်းသောအင်္ဂါရုံသည်အအေးခံရာတင်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်။ **Apocrine ချွေးဂလင်း** များသည်အဓိကတည်ရှိသည် ချိုင်းကြားနှင့်လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင်ထူသောနို့ရည်နှင့်ချွေးများထွက်လာသည် ပရိုတင်းနှင့် lipids ကဲ့သို့အော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုများကြွယ်ဝသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အနီးတစ်ဝိုက်မှာဘက်တီးရီးယားတွေကွဲတဲ့အခါအနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတယ် ဤအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ ဇီဝကမ္မအကြောင်းမသိပါ apocrine ချွေးဂလင်း၏အရေးပါပုံ သူတို့သည်အကြွင်းအကျန်များဖြစ်သည် လိင်စိတ်ရန်ဂလင်းများကိုအခြားမျိုးစိတ်များတွင်တွေ့ရသည်။

အပူဆုံးရှုံးမှုအတွက် Eccrine ချွေးကိုအရေပြားမှအငွေ့ပျံစေရမည် ဖြစ်ပွားရန် ချွေးထွက်လျှင်အရေပြားမျက်နှာပြင်မှသို့မဟုတ်ယိုကျရုံသာရှိသည် သုတ်လိုက်သည်၊ အပူဆုံးရှုံးခြင်းကိုမပြီးမြောက်ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ချွေး၏အငွေ့ပျံမှုအတိုင်းအတာကိုဆုံးဖြတ်သည့်အချက်မှာ *rela-* ပတ်ဝန်းကျင်လေထု၏ စိုထိုင်းဆ (H ₂ O va- ရာခိုင်နှုန်း por သည်အကြီးမားဆုံးပမာဏနှင့်နိုင်းယှဉ်လျှင်လေထဲတွင်လက်ရှိရှိနေသည် လေထုသည်ထိုအပူချိန်တွင်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ a ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာလေထု၌ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ ဝ ငသည် H ₂ O အငွေ့ကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိသည်။) ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆဖြစ်တဲ့အခါ မြင့်မားသည်၊ လေသည် H ₂ O နှင်ပြည့်နှက်လွန်းပါးဖြစ်နေပြီ ၊ ထို့ကြောင့်ငှင်းသည်အပူကိုဆုံးရှုံးခြင်းကိုတုံ့ပြန်သည် အရေပြားမှနေကာထပ်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ပူအိုက်စွတ်စိုသောနေ့များတွင်အနည်းငယ်အငွေ့ပျံနိုင်သောအပူဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်သည် ချွေးဂလင်းများဆက်လက်ထွက်နေသော်လည်းချွေးသည်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အရေပြားသည်အငွေ့ပျံ။ အေးစေသောအရာထက်အရည်များထွက်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု com နှင့်ဆက်စပ်သောအဆင်မပြေမှုအတိုင်းအတာကို အပူဒဏ်နှင့်စိုထိုင်းဆမြင့်မှုတို့ကိုဖိုးလေဝသပညာရှင်များကတိထွင်ခဲ့ကြသည် အပူချိန် – စိုထိုင်းဆအညွှန်း (သို့) အပူအညွှန်း (အပူ ဘယ်လောက်ခံစားရလဲ) ။

hypothalamus သည်အလုံးအရင်းကိုပေါင်းစပ်ပေးသည့် thermosensory သွင်းအားစုများ

hypothalamus သည်ခန္ဓာကိုယ်အပူထိန်းကိရိယာဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းအပူ stat သည်အခန်းတစ်ခု၏အပူချိန်ကိုခြေရာခံပြီး a ကိုအစပျိုးသည် အပူပေးစနစ် (မီးဖို) သို့မဟုတ်အအေးပေးစနစ် (အခန်းအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သလိုလေအေးပေးစက်) ညွှန်ပြ setting ။ ထို့နည်းတူစွာ hypothalamus သည်ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည် thermoregulatory ပေါင်းစည်းရေးစင်တာမှသတင်းအချက်အလတ်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဒေသအသီးသီးတွင်အပူချိန်နှင့် အပူစိုစွဲနှုန်းထွေး။ ညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းပေးမှုများစတင်သည်။ အမြတ်နှင့်အပူဆုံးရှုံးမှုယန္တရားများကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သလို၊ ပုံမှန်အပူချိန်မှ core အပူချိန်အပြောင်းအလဲများ hypothalamus သည် သင်၏အိမ်အပူထိန်းကိရိယာထက်ပိုမိုထိလွယ်ကူလွယ်သည်။ ၎င်းကိုတုံ့ပြန်နိုင်သည်အပူထိတွေ့မှုကြောင့်ယန္တရားနှစ်ခုသည်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိပေ။ သွေးအပူချိန် ၀.၀၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိသေးငယ်သည်။

အကြားနေညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာကိုသင့်လျော်စွာချိန်ညှိရန် အပူဆုံးရှုံးမှုယန္တရားများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အပူထိန်းသိမ်းရေးယန္တရားများ၊ hypothalamus သည်ဖြစ်ရမည်။

hypothalamus ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့တည်ရှိသော *moreceptors* များ ဝမ်းဗိုက်နှင့်အခြားနေရာများတွင် အရံပစ္စည်း အပိုအာရုံခံကိရိယာများ သည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်သည်။ hypothala ၌အပူချိန်ထိန်းညှိရန်အချက်အချာနှစ်ခုရှိသည်။ *posterior* ဒေသ ကြောင်းချမ်းအေး, အစပျိုးခြင်းတုံ့ပြန်မှုများက activated အပူထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပူထိန်းသိမ်းရေးကိုပြေလည်စေပါသည်။ အဆိုပါ *anterior* နွေးထွေးမှုဖြင့်အသက်သွင်းသော ဒေသသည် အပူကိုပြေလည်စေသောတုံ့ပြန်မှုများကိုအစပြုသည် အရှုံး။ hypothalamus သည်ပြည့်စုံသောနည်းလမ်းများကိုဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့။ ယင်း၏ thermoregulatory လုပ်ဆောင်ချက်များကို (ဖြည် • ပုံ 17-5) ။

တုန့်လှုပ်ခြင်းသည်မူလဆန္ဒမပါသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် အပူထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း။။

ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပူထုတ်လုပ်မှုများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အပူကိုရနိုင်သည် ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု (သို့) ပြင်ပပတ် ဝ နှံးကျင်မှုဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆုံးအရာသည်ကိုယ်အပူချိန်ထက်ပိုပူလျှင်ပြော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက်ပိုမြင့်သည်။ perature၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်အပူထုတ်လုပ်မှုသည်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အပူ အနားယူနေသူတစ် ဦး တွင်ခန္ဓာကိုယ်အပူအများစုကိုထုတ်လုပ်သည် ရင်ဘတ်နှင့်ဝမ်းဗိုက်အင်္ဂါများအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် သက်ရှိဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ ဤအခြေခံနှင့်အထက် အဆင့်၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအပူထုတ်လုပ်မှုနှုန်းသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အရိုးကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု (ပို့) အရိုးသို့အပြောင်းအလဲများကြောင့်အဓိကကျသည် အချို့သောဟော်မုန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်အတိုင်းအတာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အပြောင်းအလဲ အရိုးကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုသည်အပူရရှိမှုကိုအဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည် အပူချိန်ထိန်းညှိမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

အရိုးကြွက်သား BY HEAT ထုတ်လုပ်မှု Adjustments ခုနှစ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော core အပူချိန်ကျဆင်းခြင်းကိုတုံ့ပြန်သည် အေးပါ၊ hypothalamus သည်အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူသည်။ အရိုးကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှုသည်အပူကိုပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ ခေတ္တ ခဏတာအသစ်ပေါ်မှအဆုံးသတ်သွားသောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့် အရိုးနကြွက်သားများ၊ hypothalamus ကိုပထမဆုံးထိန်းချုပ်သည် အရိုးကြွက်သားသံကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးစေသည်။ (ကြွက်သားလေသံသည် ကြွက်သားများအတွင်းတင်းမာမှုကိုအမြဲထိန်းနေသည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။) မကြာမီတုန်ခိုက်လာသည် စတင်သည်။ **ဘီ** စည်းချက်, လှိုအရိုး mus- ပါဝင်ပါသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၁၀ မှ ၂၀ ထိလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သော ငါး ကျဲခြင်း။ ဤယန္တရားသည်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည်။ ကြွက်သားတုန်ခါမှုမလွှတ်မြောက်သောစွမ်းအင်အားလုံးသည်စုစည်းသည်။ ပြင်ပမှမည်သည့်အရာမှပြီးမြောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အပူသို့မြင့်တက်သွားသည်။ စက္ကန့်မှမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအတွင်းအပူထုတ်လုပ်သည် တုန်လှုပ်ခြင်းကြောင့်နှစ်ဆမှတိုးဆတိုးနိုင်သည်။

မကြာခဏ၊ ဤတုံ့ပြန်မှုသည်အရိုးကြွက်သားလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည် စေတနာအလျင်အမြန်၊ အပူထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်တိုးလာသည် အတက်၊ အဆင်းသို့မဟုတ်လက်ခုပ်သံကဲ့သို့။ hypo- ထိန်းချုပ်သည်။ သည်ဤအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုများအပြင် ဆန္ဒမပါဘဲဇီဝကမ္မဗေဒတုံ့ပြန်မှု။ limbic sys ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဥပမာ၊ hypothalamus သည်ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါ ဝ ငသည် လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူ (စာမျက်နှာ ၁၅၆ ကိုကြည့်ပါ) ။

ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ၌ core အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အရိုးကြွက်သားလုပ်ဆောင်မှု ဆန္ဒအလျောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ လေကအရမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါ နွေးထွေးသည်၊ လူများကငင်းသည်" ရွှေရန်ပင်ပူလွန်းသည်" ဟုညည်းညူလေ့ရှိသည်။ ဒါတွေပါ တုံ့ပြန်မှုများသည်အပူထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိပေ။

ဆေးတံနှင့်အရေခြေသဘူးချိန်နှစ်ဆုံးဖိုးကိုအဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် **thering** ဟုခေါ်ဆိုသော အမှုချိန်နှစ်ဆုံးဖိုးကိုအဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့် **receptors များ။** အဆိုပါ core ကိုအပူချိန်အားဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည် ဗဟို *ther-* ကြွေကြွေခြင်းကိုပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပထမ၊ ကြွေကြွေခြင်းကိုပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပထမ။ ကြွက်သားသံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတော်လေးနည်းသောကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း